

13 (2): 437. 1849; Heim. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam.

2. Aufl. 16c: 122. 1934.

灌木或小乔木，有时攀援。枝有刺。叶互生，具柄，叶片卵形或椭圆状披针形。花两性，通常3朵簇生枝端，外包3枚鲜艳的叶状苞片，红色、紫色或桔色，具网脉；花梗贴生苞片中脉上；花被合生成管状，通常绿色，顶端5—6裂，裂片短，玫瑰色或黄色；雄蕊5—10，内藏，花丝基部合生；子房纺锤形，具柄，1室，具1粒胚珠，花柱侧生，短线形，柱头尖。瘦果圆柱形或棍棒状，具5棱；种皮薄，胚弯，子叶席卷，围绕胚乳。

约18种。原产南美，有一些种常栽培于热带及亚热带地区。我国有2种。

属模式种：叶子花 *B. spectabilis* Willd.

### 分种检索表

1. 叶无毛或疏生柔毛；苞片长圆形或椭圆形，长成时与花几等长；花被管疏生柔毛 ..... 1. 光叶子花 *B. glabra* Choisy
1. 叶密生柔毛；苞片椭圆状卵形，长成时较花长；花被管密生柔毛 ..... 2. 叶子花 *B. spectabilis* Willd.

1. 光叶子花（中国高等植物图鉴）宝巾、簪杜鹃（广州），小叶九重葛（台湾植物志），三角花（华北习见观赏植物），紫三角、紫亚兰（云南种子植物名录），三角梅（厦门） 图版1: 8—11

*Bougainvillea glabra* Choisy in DC. Prodr. 13(2): 437. 1849; 广州植物志 170. 图74. 1956; Stemm. in Steenis, Fl. Males. ser. 1, 6 (3): 457. 1964; 海南植物志 1: 439. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 611. 图1222. 1972; 台湾植物志 2: 299. 1976.


藤状灌木。茎粗壮，枝下垂，无毛或疏生柔毛；刺腋生，长5—15毫米。叶片纸质，卵形或卵状披针形，长5—13厘米，宽3—6厘米，顶端急尖或渐尖，基部圆形或宽楔形，上面无毛，下面被微柔毛；叶柄长1厘米。花顶生枝端的3个苞片内，花梗与苞片中脉贴生，每个苞片上生一朵花；苞片叶状，紫色或洋红色，长圆形或椭圆形，长2.5—3.5厘米，宽约2厘米，纸质；花被管长约2厘米，淡绿色，疏生柔毛，有棱，顶端5浅裂；雄蕊6—8；花柱侧生，线形，边缘扩展成薄片状，柱头尖；花盘基部合生呈环状，上部撕裂状。花期冬春间（广州、海南、昆明），北方温室栽培3—7月开花。

原产巴西。我国南方栽植于庭院、公园，北方栽培于温室，是美丽的观赏植物。

花入药，调和气血，治白带、调经。

2. 叶子花（华北经济植物志要）毛宝巾（广州），九重葛（台湾植物志），三角花（上海）

*Bougainvillea spectabilis* Willd., Sp. Pl. 2: 348. 1799; Choisy in DC. Prodr. 13



图版 1 1—4. 腺果藤 *Pisonia aculeata* L. : 1. 雌株花枝; 2. 雄花; 3. 雌花; 4. 果实。5—7. 胶果木 *Ceodes umbellifera* J. et G. Forst. : 5. 枝一段; 6. 花; 7. 两性花剖开。8—11. 光叶子花 *Bougainvillea glabra* Choisy : 8. 花枝一段; 9. 苞片和花; 10. 花着生在苞片上; 11. 花剖开。

(傅季平绘)