

种子双凸镜状。

1种，产美洲热带和亚热带，亚洲、大洋洲和非洲岛屿引种。

属模式种：蕾芬 *R. humilis* L.

1. 蕾芬 (新拟) 数珠珊瑚 (中国种子植物科属词典修订版) 图版 4: 1—3

Rivina humilis L., Sp. Pl. 121. 1753; H. Walt. in Engler, Pflanzenr. 39 (N. 83): 101. fig. 30. 1909; Bailey, Man. Cult. Pl. 359. fig. 60 (Aa—Ac). 1949; Backer in Steenis, Fl. Males. ser. 1, 4 (3): 229. fig. 1951; 中国种子植物科属词典修订版 418. 1982.


半灌木，高 30—100 厘米。茎直立，枝开展，幼时被短柔毛。叶稍稀疏，互生，叶片卵形，长 4—12 厘米，宽 1.5—4 厘米，顶端长渐尖，基部急狭或圆形，边缘有微锯齿，上面无毛，下面中脉被短柔毛；叶柄长 1—3.5 厘米，被短柔毛；托叶细小，早落。总花序直立或弯曲，腋生，稀顶生，被短柔毛，连花序梗长 4—10 厘米；花梗纤细，基部具苞片，微小，披针形，基部变宽，凋落，小苞片顶生或近顶生，极小，三角形，宿存；花被片椭圆形或倒卵状长圆形，顶端圆或稍尖，凹或平，白色或粉红色，长 2—2.5 毫米，果时 3—3.5 毫米，变厚，变绿，向背面弯，宿存；雄蕊着生于下位小花盘上，比花被片短，交互着生；子房单心皮，近球形，无毛，花柱短，花后反折，柱头头状。浆果豌豆状，直径 3—4 毫米，外果皮肉质，红色或橙色，附着种子上；种子双凸镜状，直径约 2 毫米，无毛或被短毛。

原产热带美洲。我国杭州、福州、广州有栽培，可观赏，或逸为宅旁（垃圾堆）杂草。

番杏科 AIZOACEAE

一年生或多年生草本，或为半灌木。茎直立或平卧。单叶对生、互生或假轮生，有时肉质，有时细小，全缘，稀具疏齿；托叶干膜质，先落或无。花两性，稀杂性，辐射对称，花单生、簇生或成聚伞花序；单被或异被，花被片 5，稀 4，分离或基部合生，宿存，覆瓦状排列，花被筒与子房分离或贴生；雄蕊 3—5 或多数（排成多轮），周位或下位，分离或基部合生成束，外轮雄蕊有时变为花瓣状或线形，花药 2 室，纵裂；花托扩展成碗状，常有蜜腺，或在子房周围形成花盘；子房上位或下位，心皮 2、5 或多数，合生成 2 至多室，稀离生，花柱同心皮数，胚珠多数，稀单生，弯生、近倒生或基生，中轴胎座或侧膜胎座。蒴果或坚果状，有时为瘦果，常为宿存花被包围；种子具细长弯胚，包围粉质胚乳，常有假种皮。

约 130 属 1 200 种，主产非洲南部，其次在大洋洲，有些分布于全热带至亚热带干旱地区，少数为广布种。我国有 7 属，约 15 种，其中 1 属，约 5 种栽培。



图版 4 1—3. 蕃芥 *Rivina humilis* L. : 1. 花果枝; 2. 花; 3. 果实。(钱存源绘)