

带地区和澳大利亚北部也有。

据陶德定报道,西双版纳植物园标本室存有一张采自云南勐腊的标本,认为是 *Glinus herniarioides* (Gagnep.) Tard. (云南植物研究 12 (2): 133. 1990.)。未见该标本,存疑,故未列入。

3. 粟米草属* *Mollugo* L.

L., Sp. Pl. 89. 1753 et Gen. Pl. ed. 5. 39. 1754; Pax et Hoffm.

in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 226. 1934.

一年生草本。茎铺散、斜升或直立,多分枝,无毛。单叶,基生、近对生或假轮生,全缘。花小,具梗,顶生或腋生,簇生或成聚伞花序、伞形花序;花被片5,离生,草质,常具透明干膜质边缘;雄蕊通常3,有时4或5,稀更多(6—10),与花被片互生,无退化雄蕊;心皮3(—5),合生,子房上位,卵球形或椭圆球形,3(—5)室,每室有少数胚珠,着生中轴胎座上,花柱3(—5),线形。蒴果球形,果皮膜质,部分或全部包于宿存花被内,室背开裂为3(—5)果瓣;种子多数,肾形,平滑或有颗粒状凸起或脊具凸起肋棱,无种阜和假种皮;胚环形。

约20种,分布于热带和亚热带地区,欧洲和北美温暖地区也有。我国有4种。

属模式种:种棱粟米草 *M. verticillata* L.

分种检索表

1. 无茎;叶全部基生;花序自叶丛中长出,花序梗和花梗铁线状,劲挺 1. 无茎粟米草 *M. nudicaulis* Lam.
1. 有茎;叶不全部基生;花序顶生或腋生茎上。
 2. 植株细小,高7—8厘米;叶片线形;种子近半圆形,有细网纹 2. 线叶粟米草 *M. cerviana* (L.) Ser.
 2. 植株较高大,高10—30厘米;叶片非线形;种子肾形。
 3. 茎生叶叶片披针形或线状披针形;疏松聚伞花序;种子具颗粒状凸起 3. 粟米草 *M. stricta* L.
 3. 茎生叶叶片倒披针形或线状倒披针形;花簇生;种子平滑有光泽,脊具3—5条弧形肋棱 4. 种棱粟米草 *M. verticillata* L.

1. 无茎粟米草 (植物研究) 裸茎粟米草 (海南植物志) 图版 6: 8

Mollugo nudicaulis Lam., Encycl. 4: 234. 1786; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind.

* 粟米草属 (植物学大辞典)。