

1. 心叶日中花（华北经济植物志要） 花蔓草（中国植物图鉴），露花（经济植物手册）

Mesembryanthemum cordifolium L. f., Suppl. 260. 1781; 北京植物志 上册 240. 图 184. 1962; 中国高等植物图鉴 1: 616. 图 1232. 1972. —— *Aptenia cordifolia* (L. f.) N. E. Br. in Journ. Bot. 66: 139. 1928.

多年生常绿草本。茎斜卧，铺散，长 30—60 厘米，有分枝，稍带肉质，无毛，具小颗粒状凸起。叶对生，叶片心状卵形，扁平，长 1—2 厘米，宽约 1 厘米，顶端急尖或圆钝具凸尖头，基部圆形，全缘；叶柄长 3—6 毫米。花单个顶生或腋生，直径约 1 厘米；花梗长 1.2 厘米；花萼长 8 毫米，裂片 4，2 个大，倒圆锥形，2 个小，线形，宿存；花瓣多数，红紫色，匙形，长约 1 厘米；雄蕊多数；子房下位，4 室，花柱无，柱头 4 裂。蒴果肉质，星状 4 瓣裂；种子多数。 花期 7—8 月。

原产非洲南部。我国栽培供观赏，播种或扦插繁殖。

2. 冰叶日中花（华北经济植物志要） 冰花（经济植物手册） 图版 7: 1—3

Mesembryanthemum crystallinum L., Sp. Pl. 480. 1753; Fiori, Icon. Fl. Ital. fig. 1053. 1921; 北京植物志 上册 241. 1962. —— *Cryophyllum crystallinum* (L.) N. E. Br. in Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 245. 1926.

一年生或二年生草本。茎匍匐，长 30—60 厘米。叶互生，叶片扁平，带肉质，卵形或长匙形，长 15 厘米，宽 7.5 厘米，基部几心形，紧抱茎，边缘波状，有发亮颗粒，下部叶有柄。花单个腋生，直径约 2.5 厘米，几无梗；花瓣多数，线形，比萼片长，带白色或浅玫瑰红色；花柱 5，丝状，柱头 5。蒴果 5 室，裂瓣脊有翅。

原产非洲南部。我国栽培供观赏。

3. 弯叶日中花（华北经济植物志要） 佛手掌（北京植物志）

Mesembryanthemum uncatum Salm-Dyck, Monogr. 3: § 8. fig. 6. 1836—1842; 北京植物志 上册 241. 1962. —— *Glottiphyllum uncatum* (Salm-Dyck) N. E. Br. in Gard. Chron. ser. 3, 78: 413. 1925, in clavi.

多年生，茎肉质，叉状分枝。叶片舌状或三角状线形，肥厚多肉，鲜绿色，交互对生，紧密排成 2 列，长约 6 厘米，宽约 1.5 厘米，顶端具钝弯钩，基部合生。花顶生，具细长梗，橙黄色，直径约 2 厘米；花瓣和雄蕊均多数；花托膨大。 花期 5—6 月。

原产非洲南部。我国栽培供观赏。

4. 食用日中花（华北经济植物志要） 冰花果（经济植物手册）

Mesembryanthemum edule L., Syst. ed. 10. 1060. 1759; Fiori, Icon. Fl. Ital. fig. 1055. 1921; 北京植物志 上册 241. 1962. —— *Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Br. in Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 249. 1926.

多年生草本。茎有角棱，高 90 厘米以上。叶对生，叶片三棱形，弯曲，长 7—10 厘



图版 7 1—3. 冰叶日中花 *Mesembryanthemum crystallinum* L. : 1. 植株; 2. 花; 3. 果实。4. 美前日中花 *M. spectabile* Haw. : 花枝。5—7. 番杏 *Tetragononia tetragonoides* (Pall.) Kuntze: 5. 植株一部分; 6. 花; 7. 果实。(钱存源绘)