

米，粗1.2厘米，顶端渐尖，基部连合，脊缘有齿。花单生，黄色或紫色，直径6—10厘米；花梗长2.5厘米；雄蕊8，黄色，退化雄蕊多数；柱头10—16，羽毛状。果实大，肉质，可食。

原产非洲南部。我国栽培供观赏。

5. 美丽日中花（华北经济植物志要） 松叶菊（植物学大辞典），龙须海棠（北京植物志），美粲花（经济植物手册） 图版7：4

Mesembryanthemum spectabile Haw., Observ. Mesembr. 385. 1795; 北京植物志上册 242. 图185. 1962; 中国高等植物图鉴1: 616. 图1231. 1972. ——*Lampranthus spectabilis* (Haw.) N. E. Br. in Gard. Chron. ser. 3. 87: 71 (in clavi), 212. 1930.

多年生常绿草本，高30厘米。茎丛生，斜升，基部木质，多分枝。叶对生，叶片肉质，三棱线形，长3—6厘米，宽3—4毫米，具凸尖头，基部抱茎，粉绿色，有数小点。花单生枝端，直径4—7.5厘米；苞片叶状，对生；花萼5深裂，裂片不等大；花瓣多数，紫红色至白色，线形，长2—3厘米，基部稍连合；雄蕊多数，基部合生；子房下位，5室；花柱无，柱头5，线形。蒴果肉质，星状5瓣裂；种子多数。 花期春季或夏秋。

原产非洲南部。我国栽培供观赏。

7. 番杏属* *Tetragonia* L.

L., Sp. Pl. 480. 1753 et Gen. Pl. 215. 1754; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 1: 854. 1867; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 231. 1934.

肉质草本或半灌木，无毛、有毛或具白亮小颗粒状凸起（针晶体）。茎直立、斜升或平卧。叶互生，扁平，全缘或浅波状，无托叶。花两性，小形，花梗有或无，单生或数个簇生叶腋，绿色或淡黄绿色；花被3—5裂，常有角，花被筒和子房贴生；雄蕊4或更多，着生花被筒上，与花被裂片互生，单生或成束；子房下位，3—8室，每室具1粒下垂胚珠，花柱线形，与室同数。果实坚果状，陀螺形或倒卵球形，顶部常凸起或具小角；种子近肾形，胚弯曲。

50—60种，分布非洲、亚洲东部、澳大利亚、新西兰、温带南美。我国有1种。

属模式种：*T. fruticosa* L.

本属有时独立成*Tetragoniaceae*。

1. 番杏（质问本草） 法国菠菜、新西兰菠菜 图版7：5—7

* 番杏属（植物学大辞典）。