

片5；花瓣5，全缘；雄蕊10，稀为5；花柱5，通常与萼片互生，子房1室，具多数胚珠。蒴果通常5瓣裂，与萼片对生；种子双凸镜状，边缘具翅。

5种，分布于北温带。我国有1种，产于东北和西北。

属模式种：大爪草 *Sp. arvensis* L.

1. 大爪草（中国植物图鉴） 图版12：1—5

Spergula arvensis L., *Sp. Pl.* 440. 1753; *Ser. in DC. Prodr.* 1: 394. 1824; *Ledeb., Fl. Ross.* 2: 169. 1824; *Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb.* 18: 387. 1873; *Britt. et Brown., Illustr. Fl.* 2: 36. fig. 1513. 1879; *Hegi, Illustr. Fl. Mittel-Europ.* 3: 418. taf. 107. fig. 6. 621. (m—p.) 1912; *Ohwi, Fl. Jap.* 488. 1956; 东北草本植物志 3: 1. 图版1. 图1—5. 1975; 中国高等植物图鉴补编 1: 291. 图8542. 1982. — *S. vulgaris* Boenn., *Prodr. Fl. Monast.* 135. 1824; *Schischk. in Kom. Fl. USSR* 6: 551. tab. 32. fig. 5. 1936.

一年生草本。茎丛生，高13—50厘米，多分枝，被疏柔毛，上部具短腺毛。叶片线形，长1.5—4厘米，宽0.5—0.7毫米，顶端尖，稍弯曲，具1明显中脉，无毛或疏生腺毛；托叶小，膜质。聚伞花序稀疏；花小形，白色；花梗细，果时常下垂；萼片卵形，长约3毫米，顶端钝，被腺毛，边缘膜质；花瓣卵形，全缘，顶端钝，微长于萼片；雄蕊10，短于萼片；子房卵圆形，花柱极短。蒴果宽卵形，直径约4毫米，5瓣裂，明显长于宿存萼；种子近圆形，稍扁，直径1.2—1.3毫米，具狭翅，两面具乳头状凸起。花期6—7月，果期7—8月。

产黑龙江、云南（昆明）、贵州（盘县）。生于江边草地。北温带广布，南达印度和北非。模式标本采自欧洲。

可作家畜饲料。

4. 拟漆姑属* *Spergularia* (Pers.) J. et C. Presl

J. et C. Presl, *Fl. Cechica* 94. 1819; *Benth. et Hook. f., Gen. Pl.* 1: 152. 1862. — *Arenaria* Sect. *Spergularia* Pers. *Synops.* 1: 504. 1805.

多年生或一、二年生草本。茎常铺散。叶对生，叶片线形；托叶小，膜质。花两性，具细梗，成聚伞花序；萼片5，草质，顶端钝，边缘膜质；花瓣5，白色或粉红色，全缘，稀无花瓣；雄蕊10或较少；子房1室，具多数胚珠；花柱3。蒴果卵形，3瓣裂；种子

* 拟漆姑属（中国植物科属检索表）：拟漆姑草属（中国高等植物科属检索表）、牛漆姑草属（中国种子植物科属词典）、滨瓜槌草属（中国种子植物分类学）。



图版 12 1—5. 大爪草 *Spargularia arvensis* L. : 1. 带果的植株; 2. 茎的一段放大; 3. 花解剖 (去掉部分萼片和花瓣); 4. 开裂果实; 5. 种子 (仿东北草本植物志图)。6—10. 拟漆姑 *Spargularia salina* J. et C. Presl; 6. 植株; 7. 花; 8. 果实; 9. 带翅种子; 10. 不带翅种子。11—12. 二蕊拟漆姑 *S. diandra* (Guss.) Heldr. et Sart. : 11. 花; 12. 种子。 (钱存源绘)