

多数，细小，扁平，边缘具翅或无翅。

约 20 种，分布于温带地区。我国有 4 种，分布于东北和西北。

属模式种：拟漆姑 *Sp. salina* J. et C. Presl.

分种检索表

1. 种子无翅。

2. 雄蕊 5 (—10) 1. 田野拟漆姑 *Sp. rubra* (L.) J. et C. Presl

2. 雄蕊 2—3 2. 二蕊拟漆姑 *Sp. diandra* (Guss.) Heldr. et Sart.

1. 种子全部或一部分具翅。

3. 种子全部具翅；雄蕊 10 3. 缘翅拟漆姑 *Sp. media* (L.) C. Presl

3. 种子一部分具翅，多数无翅；雄蕊 5 4. 拟漆姑 *Sp. salina* J. et C. Presl

1. 田野拟漆姑 (拉汉种子植物名称)

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl, Fl. Cechica 94. 1819 — *Arenaria rubra* L. *a. campestris* L. Sp. Pl. 423. 1753. — *Spergularia campestris* (L.) Aschers. in Bot. Zeit., 17: 292. 1859 et Fl. Prov. Brandenb. 2: 94. 1859; Gorschk. in Kom. Fl. USSR 6: 558. tab. 33. fig. 5. 1936.

一年生或有时为多年生草本，高 20—25 厘米。茎平铺或斜升，基部分枝，上部被腺毛。叶片狭线形或丝状，长 5—20 毫米，宽 0.5—1 毫米，短尖，基部稍微收缩，无毛或被短柔毛；托叶卵状披针形，顶端渐尖，白色，膜质，透明，基部连合。疏聚伞花序；花梗在果时比花萼长 2—3 倍；萼片披针形，长 3—4.5 毫米，宽 1.7 毫米；花瓣淡紫红色，倒卵形，等于或短于萼片；雄蕊 5 (—10)。蒴果卵圆形，等长于或短于宿存萼；种子小，三棱状卵形，无翅，具小疣状凸起。花期 5—7 月，果期 7—10 月。

产新疆。生于海拔 840 米路旁沙地、林中旷地和盐渍化的土壤上。欧亚温带广布。模式标本采自瑞典。

2. 二蕊拟漆姑 (拉汉种子植物名称) 图版 12: 11—12

Spergularia diandra (Guss.) Heldr. et Sart. in Heldr., Herb. Graec. Norm. n° 492. n° 1124. 1855; Boiss., Fl. Orient. 1: 733. 1867; Gorschk. in Kom. Fl. USSR 6: 557. tab. 33. fig. 2. 1936. — *Arenaria diandra* Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 515. 1827.

一年生草本，高 5—15 厘米，全株被短腺毛，有时下部无毛。茎匍匐或直立、纤细，分枝。叶片狭线形或几为圆柱状，长 5—20 毫米，宽 0.3—0.5 毫米，顶端钝；托叶膜质，具三棱，顶端尖，下部 1/2 或 1/3 联合。花小，集为疏总状聚伞花序；花梗细，较花萼长 2—6 倍，稍偏向一边；萼片长圆状卵形，长 1.5—2.5 毫米，宽约 1 毫米，顶端钝，边缘白色，膜质；花瓣淡紫红色，长圆状椭圆形，短于萼片；雄蕊 3 (—2)。蒴果卵圆形，

等长或微长于宿存萼；种子极小，卵形，直径约0.5毫米，淡褐色，无翅。花期5—7月，果期6—9月。

产宁夏、甘肃、青海、新疆。生于海拔920—2600米的潮湿盐碱化草地、山沟湿地、河滩地、水沟边潮湿处。地中海沿岸、中亚和非洲北部也有。

3. 缘翅拟漆姑 (拉汉种子植物名称)

Spergularia media (L.) C. Presl, Fl. Sic. 1: 161. 1826. — *Arenaria media* L., Sp. Pl. ed. 2 606. 1762. — *A. marginata* DC., Fl. France 5: 793. 1815. — *Spergularia marginata* (DC.) Kitt. Taschenb. Fl. Deutschl. 2. Aufl. 1004. 1844; Boiss., Fl. Orient. 1: 733. 1867; Gorschk. in Kom. Fl. USSR 6: 557. tab. 33. fig. 3. 1936.

多年生草本，高15—30厘米。茎直立或稍外倾，分枝，上部被腺柔毛。叶片线形，呈半圆柱状，肉质，长1—2厘米，宽1毫米，顶端渐尖；托叶披针形，长渐尖，基部连合。聚伞花序；花梗长于花萼2—3倍；萼片披针形或长圆状卵形，长5—7毫米，宽1.5—2毫米，边缘膜质；花瓣红色，稀白色，长圆形，与萼等长或稍长；雄蕊10，稀5。蒴果卵圆形，比宿存萼长1.5—2倍；种子圆形，直径约1毫米，平滑或微具疣状凸起，边缘具白色膜质宽翅。花期5—8月、果期8—10月。

产内蒙古、新疆。生于海拔1200米的河岸附近含有盐分的土壤中或河滩上。阿尔泰山、伊朗、阿富汗、澳大利亚及非洲北部也有。模式标本采自欧洲。

4. 拟漆姑 (东北植物检索表) 牛漆姑草 (中国种子植物科属词典) 图版12: 6—10

Spergularia salina J. et C. Presl, Fl. Cechica 95. 1819; Gorschk. in Kom. Fl. USSR 6: 561. tab. 33. fig. 4. 1936; Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 88: 302. 1939; 秦岭植物志 1 (2): 208. 图178. 1974; 东北草本植物志 3: 3. 图版1. 图6. — 11. 1975; 内蒙古植物志 2: 159. 图版85. 图6—10. 1978. — *Arenaria rubra* L. β . *marina* L., Sp. Pl. 423. 1753. — *Spergularia marina* (L.) Griseb., Spicil. Fl. Rumel. 1: 213. 1843; Ohwi, Fl. Jap. 489. 1956; P. Monnier et A. Ratte in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 155. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 621. 图1241. 1972.

一年生草本，高10—30厘米。茎丛生，铺散，多分枝，上部密被柔毛。叶片线形，长5—30毫米，宽1—1.5毫米，顶端钝，具凸尖，近平滑或疏生柔毛；托叶宽三角形，长1.5—2毫米，膜质。花集生于茎顶或叶腋，成总状聚伞花序，果时下垂；花梗稍短于萼，果时稍伸长，密被腺柔毛；萼片卵状长圆形，长3.5毫米，宽1.5—1.8毫米，外面被腺柔毛，具白色宽膜质边缘；花瓣淡粉紫色或白色，卵状长圆形或椭圆状卵形，长约2毫米，顶端钝；雄蕊5；子房卵形。蒴果卵形，长5—6毫米，3瓣裂；种子近三角形，略扁，长0.5—0.7毫米，表面有乳头状凸起，多数种子无翅，部分种子具翅。花期5—7月，果期6—9月。



图版 12 1—5. 大爪草 *Spargularia arvensis* L. : 1. 带果的植株; 2. 茎的一段放大; 3. 花解剖 (去掉部分萼片和花瓣); 4. 开裂果实; 5. 种子 (仿东北草本植物志图)。6—10. 拟漆姑 *Spargularia salina* J. et C. Presl; 6. 植株; 7. 花; 8. 果实; 9. 带翅种子; 10. 不带翅种子。11—12. 二蕊拟漆姑 *S. diandra* (Guss.) Heldr. et Sart. : 11. 花; 12. 种子。 (钱存源绘)