

6. 多莢草屬* *Polycarpon* Loefl. ex L.

L., Syst. Nat. ed. 10, 881. 1759; Pax et Hoffm. in Engler u.

Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 308. 1934.

一年生或多年生草本。茎铺散，无毛或被柔毛。叶对生或有时呈假轮生状，叶片卵形或长椭圆形；托叶膜质。花小形，多数，成密聚伞花序；苞片薄膜质；萼片5，白色，边缘透明，背部中央具脊；花瓣5，小形，透明，全缘或2齿裂；雄蕊3—5；子房1室，具多数胚珠；花柱3，基部合生。蒴果3瓣裂；种子卵圆形。

约16种，分布于热带及亚热带地区。我国有1种，产于南部和西南部。

属模式种：*P. tetraphyllum* L.

1. 多莢草（广州植物志） 图版13: 1—3

Polycarpon prostratum (Forssk.) Aschers. et Schweinw. ex Aschers. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 39: 128. 1889; Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 54. 1979. — *Alsine prostratum* Forssk., Fl. Aegypt. Arab. 207. 1775. — *Loeflingia indica* Retz., Obs. Bot. 4: 8. 1786. — *Polycarpon loeflingiae* Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 1: 153. 1862; Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 245. 1874; Mizushima in Hara et al. Fl. East. Himal. 81. 1966. — *P. indicum* (Retz.) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 10: 302. 1915 et Lingnan Sci. Journ. 5: 73. 1927; 广州植物志 128. 1956; 海南植物志 1: 378. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 620. 图1239. 1972. — *Pharnaceum depressum* L., Mant. Pl. 2: 562. 1771.

一年生草本。主根长，具多数须根。茎丛生，铺散，长10—25厘米，疏生柔毛，稀无毛。叶假轮生，叶片匙形或线状长圆形，长5—15毫米，宽1.5—2.5毫米，顶端尖，基部渐狭，无毛。聚伞花序密簇生，圆锥状；苞片卵形，膜质，透明；花梗短或近无，被细柔毛；萼片狭披针形，长2.5—3毫米，中部厚，深褐色，边缘白色，膜质，顶端钝，外面有脊；花瓣线状长圆形，短于萼片，白色，膜质，透明，顶端全缘；雄蕊5，短于萼片；子房卵形；花柱顶端3裂。蒴果卵形，短于宿存萼；种子长圆形或卵形，直径0.25毫米，淡褐色。花期2—5月，果期5—6月。

产福建、广东、海南、广西、云南。生于海拔350—1500米的农田中，不常见。亚洲和非洲热带地区也有。

* 多莢草属（中国植物科属检索表）。



图版 13 1—3. 多荚草 *Polycarpon prostratum* (Forssk.) Aschers. et Schweinw.; 1. 植株; 2. 花; 3. 雌蕊。4—7. 白鼓钉 *Polycarpha corymbosa* (L.) Lam.; 4. 植株; 5. 花; 6. 果实; 7. 种子。

(仲世奇绘)