

49. 雄蕊 5; 花序无总苞片 52. 亚伞花繁缕 *St. subumbellata* Edgew.

亚组 1. 繁缕亚组 Subsect. *Stellaria*

萼片分离达基部; 雄蕊下位或周位; 种子多数; 叶一般较宽, 通常下部叶具柄, 稀全部无柄或近无柄; 茎通常平滑, 不具棱。

我国有 4 系, 24 种 5 变种。

系 1. 柄叶系 Ser. *Petiolares* Fenzl in Endl. Gen. Pl. 969. 1840; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 394. 1936.

全部叶或中下部的叶有柄。

我国有 13 种 3 变种。

1. 长瓣繁缕 (拉汉种子植物名称)

Stellaria bungeana Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 376. 1842; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 395. 1936; Chater et Heywood in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 134. 1964. — *St. nemorum* auct., non L.; Bge. in Ledeb. Fl. Alt. 2: 152. 1830. — *St. nemorum* β. *bungeana* Regel, Tent. Fl. Ussur. 28. 1861.

1a. 长瓣繁缕 (原变种)

var. *bungeana*

产俄罗斯 (西伯利亚)。我国无分布。

1b. 林繁缕 (变种) (东北草本植物志)

var. *stuebendorffii* (Regel) Y. C. Chu in Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Orient. 3: 29. tab. 11. fig. 1—4. 1975; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. 7(1): 70. 1985. — *St. nemorum* L. γ. *stuebendorffii* Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou 35 (1): 270. 1862; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 18 (4): 392. (Mél. Biol. 9: 52) 1873 et Enum. Fl. Mongol. 1: 99. 1889 et Act. Hort. Petrop. 11: 71. 1890. — *St. bungeana* auct., non Fenzl; Maxim. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 9: 58. (Prim. Fl. Amur.) 1859; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22 (Fl. Mansh. 2): 167. 1903; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 204. 1939; 东北植物检索表 56. 1959; Kitagawa, Neo-Lineam. Fl. Mansh. 276. 1979. — *St. nemorum* auct., non L.; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 68. 1886; Simpson in Journ. Linn. Soc. Bot. 41: 407. 1913.

多年生草本, 高 50—80 厘米。茎上升或直立, 单一或分枝, 被一系列多细胞柔毛。叶片卵形、卵状长圆形或卵状披针形, 长 4—8 厘米, 宽 2—3 (—4) 厘米, 顶端渐尖, 基部近心形、圆形或楔形, 两面近无毛, 边缘具多细胞缘毛, 茎下部叶有短柄, 中上部叶无柄。聚伞花序顶生; 苞片草质, 卵形, 具缘毛; 花梗长 10—30 毫米, 密被腺柔毛; 萼