

来 Hara 处理可能是对的, 因叶无柄。待见到台湾标本再定, 姑置于此。

8. 无瓣繁缕 (新拟) 图版 34: 11—15


Stellaria apetala Ucria ex Roem. Arch. 1 (1): 68. 1796; Gleason in New Britt. and Brown Illust. Fl. (4th print.) 2: 124. 1968, in nota; D. X. Gu et P. S. Hsu in Guihaia 9 (3): 265. 1989; C. Y. Wu in Act. Bot. Yunnan. 13 (4): 352. 1991. — *St. media* (L.) Cyr. subsp. *media* var. *apetala* (Ucria) Gauden, Fl. Helv. 3: 180. 1828; Hegi, Illustr. Fl. Mittel-Europ. III (2): 889. 1979. — *St. media* (L.) Cyr. f. *apetala* Rouy et Fouc., Fl. de France 3: 230. 1896. — *St. pallida* auct., non (Dumort.) Piré; Pobed. in Bull. Jard. Bot. Princ. USSR 28: 584. 1929; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 397. 1936; Chater et Heywood in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 134. 1964. — *St. anhweiensis* auct., non Migo; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. 7 (1): 82. 1985.

茎通常铺散, 有时上升, 基部分枝有 1 列长柔毛, 但绝不被腺柔毛。叶小, 叶片近卵形, 长 5—8 毫米, 有时达 1.5 厘米, 顶端急尖, 基部楔形, 两面无毛, 上部及中部者无柄, 下部者具长柄。二歧聚伞状花序; 花梗细长; 萼片披针形, 长 3—4 毫米, 顶端急尖, 稀卵圆状披针形而近钝, 多少被密柔毛, 稀无毛; 花瓣无或小, 近于退化; 雄蕊 (0—) 3—5 (—10); 花柱极短。种子小, 淡红褐色, 较 *St. media* (L.) Cyr. 和 *St. neglecta* Weihe 等小 2—3 倍, 直径 0.7—0.8 毫米, 具不显著的小瘤凸, 边缘多少锯齿状或近平滑。 $2n=40, 42, 44$ 。

现仅记载于江苏、新疆。为常见杂草。欧洲、亚洲和北美洲均有分布。

9. 簪姑草 (云南植物研究) 接筋草 (陕西、湖北), 筋骨草 (四川), 抽筋草 (四川、陕西), 石灰草 (河南), 疏花繁缕 (台湾植物志), 石生繁缕 (秦岭植物志), 星毛繁缕、假石生繁缕 (云南植物名录)

Stellaria vestita Kurz in Journ. Bot. 11: 194. 1873 et l. c. 12: 120. 1874; Mizushima in Ohashi, Fl. East. Himal. 1st rep. 85. 1966 et l. c. 2nd rep. 26. 1971, in obs.; 台湾植物志 2: 353. pl. 331. 1976; 西藏植物志 1: 697. 图 223: 11—15. 1983; Griers. in Fl. Bhutan 1 (2): 206. 1984; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. 7 (1): 71. 1985; C. Y. Wu in Act. Bot. Yunnan. 13 (4): 353. 1991. — *St. saxatilis* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 215. 1825, non Scopoli (1772); Wall., Cat. n. 634. 1828; Miq., Fl. Sud. Bot. 1 (1): 1054. 1855; Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 232. 1874; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 69. 1886; Franch., Pl. Delav. 99. 1889; Maxim. in Act. Hort. Petrop. 11: 72. 1890; E. Pritz. in Engl.'s Bot. Jahrb. 29: 320. 1900; Koord., Exkurs.-Fl. Java 2: 211. 1912; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 190. 1929; Hao in Engl.'s Bot. Jahrb. 68: 594. 1938; Mizushima in



图版 34 1—4. 沙生繁缕 *Stellaria arenaria* Maxim. : 1. 植株; 2. 腋生花; 3. 花; 4. 雌蕊和雄蕊 (放大)。5—10. 偃卧繁缕 (原变种) *St. decumbens* Edgew. var. *decumbens* : 5. 植株; 6. 花瓣; 7. 雌蕊; 8. 花; 9. 花瓣; 10. 雄蕊和雌蕊。11—15. 无瓣繁缕 *St. apetala* Ucria ex Roem. : 11. 植株; 12. 叶; 13. 花; 14. 果实; 15. 种子。(钱存源绘)