

因此该种不能成立，而应列入 *Stellaria infracta* Maxim. 的异名之一。

17. 吉隆繁缕 (西藏植物志)

*Stellaria gyirongensis* L. H. Zhou in C. Y. Wu, Fl. Xizang. 1: 700. tab. 225. fig. 17—21. 1983.

草本，全株无毛。茎长 15—30 厘米，细弱，具光泽。叶片卵形，质薄，淡绿色，长 1—2.5 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，顶端尖，基部圆形，具短柄或近无柄，中脉凸起。花数朵，顶生；苞片披针形，长 0.5—1 厘米，膜质；花梗长 1—3.5 厘米，纤细，绿色，具光泽；萼片 5，披针形，长 3—5 毫米，膜质，顶端长渐尖，基部较宽，具 1 脉；花瓣 5，白色，与萼片近等长，2 深裂；雄蕊短于花瓣，花药黄色；子房卵形，花柱 3，细线形。蒴果未见 (标本未见)。

产我国西藏 (吉隆)。生于海拔 2 450 米的山坡杂木林下。模式采自吉隆芒木附近。

18. 藏南繁缕 (东北林学院植物研究室汇刊)

*Stellaria zangnanensis* L. H. Zhou in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. no. 9, 56. fig. 2. 1980; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. 7 (1): 73. 1985.

草本，全株被腺柔毛。茎高 10—30 厘米，黄色。叶片卵形，长 0.5—1.5 厘米，宽 3—7 毫米，顶端急尖，基部圆形，近无柄，边缘具缘毛，两面被腺柔毛。聚伞花序具多花；苞片卵状披针形，长 0.5—1 厘米，宽 2—3 毫米，顶端渐尖，基部圆形，两面被腺柔毛；花梗长 0.5—1.5 厘米，密被腺柔毛；萼片 5，披针形，长 3—4 毫米，宽约 1 毫米，顶端渐尖，基部较宽，边缘膜质，外面被腺柔毛；花瓣 5，白色，长 2—3 毫米，2 深裂达基部，裂片线形；雄蕊 8，与花瓣近等长；花柱 3，线形。蒴果长卵形，长 3—4 毫米，宽约 1 毫米，与宿存萼近等长或稍长；种子圆肾形，褐色，表面有皱褶。花期 5—6 月，果期 7—8 月。

产西藏 (察隅、墨脱)、云南 (贡山、片马)。生于海拔 (1 900—) 2 300—2 700 米处的沟边草丛。模式标本采自西藏察隅。

本种与西藏繁缕 *Stellaria tibetica* Kurz 相近，但本种茎高 10—30 厘米，全株被腺状柔毛；叶片长圆状卵形，长 0.5—1.5 厘米，宽 3—7 毫米；苞片卵状披针形；萼片椭圆状披针形，长 3—4 毫米；花瓣与萼片等长或稍长，深 2 裂至基部。

《西藏植物志》漏列。根据 Arn. Arb. 所藏缅甸 (Nam Tamai valley 及 Wang Bum 标本，2 700—3 000 米处) 标本及 *St. sikkimensis* Hook. f. ex Edgew. et Hook. f. (1874) 的合模式同号标本。由于缅甸标本处于中间状态，本种或应并入 *St. sikkimensis* Hook. f. ex Edgew. et Hook. f.。

19. 西藏繁缕 (西藏植物志)

*Stellaria tibetica* Kurz in Regensb. Fl. 285. 1872; Edgew. et Hook. f. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 1: 231. 1874; 西藏植物志 1: 693. 1983; P. Ke in Act. Bot. Yunnan.