

叶片线状披针形、披针形或长圆状披针形，长5—25毫米，宽1.5—5毫米，顶端渐尖。蒴果常具1种子。花期6—7月，果期7—8月。

产内蒙古、辽宁（赤峰）、陕西、甘肃、宁夏。生于海拔1250—3100米的石质山坡或石质草原。蒙古、俄罗斯也有。

根供药用，可清虚热。用于阴虚发热、疳积发热。

22c. **线叶繁缕**（变种） 线叶叉繁缕（东北草本植物志） 图版27: 9

var. **linearis** Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 38. 1842; 东北草本植物志 3: 33. 图版13. 图6. 1975; 内蒙古植物志 2: 171. 1978, specim excl.; Y. Z. Zhao in Bull. Bot. Research 5 (4): 145. 1985; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. 7 (1): 75. 1985.

茎及花梗被1列短柔毛；叶片线形，长5—20毫米，宽1—2毫米，无毛；萼片长圆形，约长3毫米，外面无毛。

产内蒙古（大青山）、陕西（清涧）。生于海拔500—1650米的草原沙质地或向阳山坡。

本变种叶的大小及毛被的疏密程度常多变化。原变种与线叶繁缕（变种）的叶形有过渡，两者的毛也由密到疏，有时仅茎及花梗被短柔毛，其余部分则无毛。线叶繁缕的叶特别狭，毛被极少。

23. **钝萼繁缕**（植物研究） 图版27: 10—11

Stellaria amblyosepala Schrenk, Enum. Pl. Nov. 2: 54. 1842; Krylov, Fl. Sib. Occid. 5: 992. 1931; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 398. 1936; Грубов, Опред. Сос. Раст. Монг. 100. 1982; Y. Z. Zhao in Bull. Bot. Research 5(4): 144. 1985. — *St. dichotoma* L. f. *rigida* Bge., Suppl. Fl. Alt. 34. 1836 et Ledeb. Fl. Ross. 1: 380. 1842. — *St. rigida* L. f. *typica* Regel in Act. Hort. Petrop. 5(4): 252. 1877. — *St. potaninii* Krylov, Бот. Матер. Собр. Потан. в Вост. и. Семипалат Обл. 64. 1891. — *St. dichotoma* L. var. *linearis* auct., non Fenzl; 内蒙古植物志 2: 171. 1978.

多年生草本，全株被短腺毛。主根长圆柱形。茎多数丛生，铺散，四棱形，长15—30厘米。叶无柄，叶片条形至线状披针形，长1—3.5厘米，宽1.5—5毫米，顶端急尖，基部渐狭，两面近无毛。花序顶生，为疏松的二歧式聚伞花序；花梗丝状，长1.5—2.5厘米，被短腺毛；萼片5，长圆形，长3.5—4毫米，宽1.5—2毫米，顶端圆钝，边缘宽膜质，外面被稀疏短腺毛，中脉明显；花瓣5，白色，与萼片等长或稍短，2浅裂，裂片长圆状卵形，叉开，顶端钝；雄蕊10，与花瓣近等长；花柱3，线形。蒴果比宿存萼短，卵球形，6裂；种子圆卵形，微扁，直径约1.5毫米，黑褐色，一端具钝尖，具小瘤状凸起。花期5—7月。

产内蒙古（大青山、狼山、桌子山、龙首山）、新疆（巴仑台、和硕、和靖、阿尔泰、塔城）、甘肃。生于石质山坡、石砾地，阴坡疏林下，沟谷的旱生植物，海拔至1800米。

俄罗斯(西西伯利亚)、哈萨克、蒙古也有。模式标本采自准噶尔至阿尔泰。

系 4. 硬骨草系 Ser. *Holosteae* Fenzl in Endl. Gen. Pl. 969. 1840; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 401. 1936.

叶片线状披针形; 苞片草质; 萼片具不明显的脉; 雄蕊 5, 花柱 3。

我国仅有 1 种。

24. 湖北繁缕 (湖北植物志)

Stellaria henryi Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 34: 434. 1899; 湖北植物志 1: 292. 图 401. 1976; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. 7 (1): 75. 1985.

一年生草本, 高 15—30 厘米。茎单生, 近直立, 细弱, 上部分枝, 无毛或被疏柔毛。叶片线状披针形, 长 1—2 厘米, 宽 3—5 毫米, 顶端渐尖, 基部宽楔形, 两面无毛, 具单脉, 边缘有时微波状; 叶柄短, 长约 2 毫米。花单生或为聚伞花序, 由叶腋生出; 花梗长 1—2.5 厘米; 萼片 5, 披针形, 有时散生紫色硬毛; 花瓣 5, 2 深裂, 长为花萼的 1.5 倍; 雄蕊 5, 花丝细; 子房椭圆形; 花柱 3, 短线形, 略短于子房。蒴果圆球形, 6 裂; 种子未见。花期 4—5 月, 果期 6—9 月。

产四川南部、湖北西部(巴东)。生于山坡石缝中。模式标本采自四川南部。

种子供药用, 有生津止渴、平喘顺气之功效。

亚组 2. 雀舌草亚组 Subsect. *Larbraea* (St. Hil.) Fenzl in Endl. Gen. Pl. 969. 1840. — *Larbraea* St. Hil. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 2: 287. 1815, pro gen.

萼片多少在基部合生成倒锥形; 雄蕊周位; 种子多数; 叶一般较狭, 全部叶无柄或近无柄; 茎通常具棱, 稀平滑。

我国有 7 系 28 种 5 变种 2 变型。

系 1. 叶苞系 Ser. *Foliaceo-bracteatae* Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 402. 1936.


叶片卵状披针形或披针形, 长超过宽 1.5—3 倍; 花小形, 长达 4 毫米。

我国有 3 种及 1 变种。

25. 无苞繁缕

Stellaria ebracteata Kom. in Act. Hort. Petrop. 18: 441. 1901 et l. c. 22: tab. 3, 4. 1904; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 404. 1936.

多年生草本 (Komarov 原作一年生)。根纤细, 丝状。茎单一, 不分枝, 上升或直立, 高 15—20 厘米 (原误作 1.5—2 厘米), 具细条纹, 一侧具毛。叶无柄或具短柄, 叶片质薄, 卵状披针形或披针形, 长 2—3 厘米, 宽 0.4—1 厘米, 顶端急尖, 无毛或下面和边缘被疏毛。花单生, 稀成对顶生, 直径达 8 毫米, 通常具 2—3 厘米的长梗, 被极短柔毛;



图版 27 1—3. 内弯繁缕 *Stellaria infracta* Maxim.: 1. 花果枝; 2. 叶一部分 (示毛); 3. 花。4—8. 叉歧繁缕 (原变种) *St. dichotoma* L. var. *dichotoma*: 4. 果枝; 5. 茎一段 (示毛); 6. 花; 7. 果实; 8. 种子。9. 线叶繁缕 (变种) *St. dichotoma* L. var. *linearis* Fenzl; 花枝。10—11. 钝萼繁缕 *St. amblyosepala* Schrenk.: 10. 花果枝; 11. 花。(钱存源绘)