

## 20. 山蚂蚱草 (拉汉种子植物名称) 旱麦瓶草 (中药志), 叶尼塞蝇子草

*Silene jensseensis* Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. 1: 154. 1809; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 627. tab. 38. fig. 4. 1936 (p. p. quoad f. *vulgaris* et *latifolia*); Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 202. 1936; 东北草本植物志 3: 70. 图版 28. 图 1—6, 1975; 中国高等植物图鉴补编 1: 331. 图 8572. 1982. — *S. jenssea* Poir., Encycl. Suppl. 5: 154. 1817. — *S. jenssea* Steph. ex Bge. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 2: 544. 1835; Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou 15: 574. 1842 (p. p. quoad *α. vulgaris* et *ε. latifolia*). — *S. tenuis* Willd. *δ. jenssea* Rohrb., Monogr. Silene 187. 1868; Franch., Pl. David. 1: 49. 1884; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 32: 143. 1896; Nakai, Fl. Kor. 1: 78. 1909. — *S. jensseensis* Willd. var. *vegetior* Popov в Список, Растений Гербария Фл. СССР 14: 15. 1957 et Фл. Сред. Сиб 1: 428. 1957. — *S. tenuis* auct., non Willd. (1809); Fl. Sin. Bor.-Orient.

## 20a. 山蚂蚱草 (原变种)

var. *jensseensis*

## (1) 山蚂蚱草 (原变型)

f. *jensseensis*

多年生草本。高 20—50 厘米。根粗壮, 木质。茎丛生, 直立或近直立, 不分枝, 无毛, 基部常具不育茎。基生叶叶片狭倒披针形或披针状线形, 长 5—13 厘米, 宽 2—7 毫米, 基部渐狭成长柄状, 顶端急尖或渐尖, 边缘近基部具缘毛, 余均无毛, 中脉明显; 茎生叶少数, 较小, 基部微抱茎。假轮伞状圆锥花序或总状花序, 花梗长 4—18 毫米, 无毛; 苞片卵形或披针形, 基部微合生, 顶端渐尖, 边缘膜质, 具缘毛; 花萼狭钟形, 后期微膨大, 长 8—10 (—12) 毫米, 无毛, 纵脉绿色, 脉端连结, 萼齿卵形或卵状三角形, 无毛, 顶端急尖或渐尖, 边缘膜质, 具缘毛; 雌雄蕊柄被短毛, 长约 2 毫米; 花瓣白色或淡绿色, 长 12—18 毫米, 爪狭倒披针形, 无毛, 无明显耳, 瓣片叉状 2 裂达瓣片的中部, 裂片狭长圆形; 副花冠长椭圆状, 细小; 雄蕊外露, 花丝无毛; 花柱外露。蒴果卵形, 长 6—7 毫米, 比宿存萼短; 种子肾形, 长约 1 毫米, 灰褐色。花期 7—8 月, 果期 8—9 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、河北、内蒙古、山西。生于海拔 250—1 000 米的草原、草坡、林缘或固定沙丘。朝鲜、蒙古和俄罗斯 (西伯利亚和远东地区) 也有。模式标本采自西西伯利亚 (叶尼塞河沿岸)。

根入药, 称山银柴胡, 治阴虚潮热、久疟、小儿疳热等症。

## (2) 丝叶山蚂蚱草 (变型)

f. *setifolia* (Turcz.) Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 628. 1936; 东北草本植物志 3: 71. 图版 28. 图 10. 1975; Y. Z. Zhao in Act. Sci. Nat. Univ. Intramongol. 16