

本属仅1种，广布欧洲和亚洲。我国亦产。

属模式种：狗筋蔓 *C. baccifer* L.

1. 狗筋蔓（救荒本草） 白牛膝（云南），抽筋草（贵州），筋骨草（四川） 图版 64: 5—9

Cucubalus baccifer L., Sp. Pl. 414. 1753; Diels in Engl. 's Bot. Jahrb. 29: 319. 1901; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22(Fl. Mansh. 2): 205. 1903; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 209. 1929; Walters in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 181. 1964; A. Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 26: 345. 1965; 中国高等植物图鉴 1: 642. 图 1283. 1972; Hara et al., Enum. Fl. Nepal 2: 53. 1979; 西藏植物志 1: 707. 1983. — *Cucubalus baccifer* L. var. *japonicus* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 2: 210. 1866; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 196. 1939; Ohwi, Fl. Jap. 501. 1953; 东北草本植物志 3: 41. 图版 16. 图 4—6. 1975. — *C. baccifer* L. var. *cavaleriei* Lévl., Fl. Kouy-Tchéou 67. 1914. — *C. baccifer* L. var. *angustifolius* L. H. Zhou in C. Y. Wu, Fl. Xizang. 1: 709. fig. 227: 5—10. 1983.


多年生草本，全株被逆向短绵毛。根簇生，长纺锤形，白色，断面黄色，稍肉质；根颈粗壮，多头。茎铺散，俯仰，长50—150厘米，多分枝。叶片卵形、卵状披针形或长椭圆形，长1.5—5（—13）厘米，宽0.8—2（—4）厘米，基部渐狭成柄状，顶端急尖，边缘具短缘毛，两面沿脉被毛。圆锥花序疏松；花梗细，具1对叶状苞片；花萼宽钟形，长9—11毫米，革质，后期膨大呈半圆球形，沿纵脉多少被短毛，萼齿卵状三角形，与萼筒近等长，边缘膜质，果期反折；雌雄蕊柄长约1.5毫米，无毛；花瓣白色，轮廓倒披针形，长约15毫米，宽约2.5毫米，爪狭长，瓣片叉状浅2裂；副花冠片不明显微呈乳头状；雄蕊不外露，花丝无毛；花柱细长，不外露。蒴果圆球形，呈浆果状，直径6—8毫米，成熟时薄壳质，黑色，具光泽，不规则开裂；种子圆肾形，肥厚，长约1.5毫米，黑色，平滑，有光泽。2n=24。 花期6—8月，果期7—9（—10）月。

产我国辽宁、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、新疆、江苏、安徽、浙江、福建、台湾、河南、湖北、广西至西南。生于林缘、灌丛或草地。欧洲、朝鲜、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦也有。

根或全草入药，用于骨折、跌打损伤和风湿关节痛等。

2. 石竹族 Trib. DIANTHEAE Pax

Pax in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (1 b.): 74. 1889; Pax et Hoffm. l. c. 2. Aufl. 16c: 351. 1934; — *Caryophyllaceae* subdiv. *Diantheae* Reichb., Handb. 298. 1837. — *Sileneae* trib. *Diantheae* A. Br. in Flora 26: 377. 1843.



图版 64 1—4. 麦仙翁 *Agrostemma githago* L. : 1. 根; 2. 花枝; 3. 花瓣; 4. 种子。5—9. 狗筋蔓 *Cucubalus baccifer* L. : 5. 花枝; 6. 花; 7. 花瓣; 8. 果实; 9. 种子。(李志民绘)