

12. 圆锥石头花（中国高等植物图鉴补编） 锥花丝石竹（华北经济植物志要），圆锥花丝石竹（经济植物手册），丝石竹（北京植物志），锥花霞草（拉汉种子植物名称），满天星 图版 115：1—6

Gypsophila paniculata L., Sp. Pl. 407. 1753; Ser. in DC. Prodr. 1: 353. 1824; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 749. tab. 47. fig. 3. 1936; Bailey, Man. Cult. Pl. 380. 1949; Байтевов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 405. табл. 42. рис. 3. 1960; Barkoudah in Wentia 9: 95. 1962; Barkoudah et Chater in Tutiu et al. Fl. Europ. 1: 183. 1964; 中国高等植物图鉴补编 1: 336. 1982; Грубов, Опред. Сос. Раст. Монг. 105. 1982; 新疆植物检索表 2: 255. 1983; 中国沙漠植物志 1: 471. 图版 172: 10—11. 1985.

多年生草本，高 30—80 厘米。根粗壮。茎单生，稀数个丛生，直立，多分枝，无毛或下部被腺毛。叶片披针形或线状披针形，长 2—5 厘米，宽 2.5—7 毫米，顶端渐尖，中脉明显。圆锥状聚伞花序多分枝，疏散，花小而多；花梗纤细，长 2—6 毫米，无毛；苞片三角形，急尖；花萼宽钟形，长 1.5—2 毫米，具紫色宽脉，萼齿卵形，圆钝，边缘白色，膜质；花瓣白色或淡红色，匙形，长约 3 毫米，宽约 1 毫米，顶端平截或圆钝；花丝扁线形，与花瓣近等长，花药圆形；子房卵球形，直径约 1 毫米，花柱细长。蒴果球形，稍长于宿存萼，4 瓣裂；种子小，圆形，直径约 1 毫米，红褐色，具整齐的钝疣状凸起。 花期 6—8 月，果期 8—9 月。


产新疆阿尔泰山区和塔什库尔干。生于海拔 1 100—1 500 米河滩、草地、固定沙丘、石质山坡及农田中。哈萨克斯坦、俄罗斯（西伯利亚）、蒙古（西部）、欧洲（西部、中部和东部）、北美也有。模式标本采自俄罗斯西伯利亚。

根、茎可供药用。栽培可供观赏。

13. 钝叶石头花（中国高等植物图鉴补编） 图版 115: 7—12

Gypsophila perfoliata L., Sp. Pl. 408. 1753. p. p. in Orient.; Ser. in DC. Prodr. 1: 352. 1842; Ledeb., Fl. Ross. 1: 297. 1842; Barkoudah in Wentia 9: 103. pl. 9. fig. 15—22. 1962; Barkoudah et Chater in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 183. 1964; 中国高等植物图鉴补编 1: 337. 图 8579. 1982. ——*G. trichotoma* Wend. in Linnaea 11: 92. 1837; Boiss., Fl. Orient. 1: 541. 1867; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 759. 1936; Байтевов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 408. табл. 42. рис. 4. 1960; Грубов, Опред. Сос. Раст. Монг. 104. 1982; 新疆植物检索表 2: 256. 1983; 中国沙漠植物志 1: 469. 图版 171: 3—5. 1985.

多年生草本，高达 70 厘米。茎直立，上部多分枝，下部被短腺柔毛。叶片倒卵状长圆形或卵状长圆形，长 3—7 厘米，宽 1—3 厘米，基部微连合，稍抱茎，被腺毛，具 3—5 脉。聚伞花序圆锥状，疏展；花梗纤细，长 4—15 毫米，无毛；苞片三角形，渐尖，无毛；花萼宽钟形，长 2—4 毫米，具绿色脉纹，萼齿裂达中部，卵形，顶端钝，边缘白色，



图版 115 1—6. 圆锥石头花 *Gypsophila paniculata* L. : 1. 植株下部; 2. 植株上部; 3. 花和苞片;
4. 花瓣和雄蕊; 5. 花萼和雌蕊; 6. 果实和宿存萼。7—12. 钝叶石头花 *G. perfoliata* L. : 7. 植
株下部; 8. 花序; 9. 花和苞片; 10. 花瓣和雄蕊; 11. 花萼和雌蕊; 12. 果实和宿存萼。

(李志民绘)