

我国产1种。

17. 缕丝花 (拉汉种子植物名称) 丝石竹 (华北经济植物志要)

*Gypsophila elegans* M. Bieb., Fl. Tauc.-Cauc. 1: 319. 1808; Ser. in DC. Prodr. 1: 353. 1824; Fiori, Icon. Fl. Ital. 149. fig. 1207. 1921; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 764. 1936; Bailey, Man. Cult. Pl. 381. 1949; Barkoudah in Wentia 9: 134. pl. 14. fig. 1—6. 1962; Barkoudah et Chater in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 184. 1964; 中国高等植物图鉴补编 1: 337. 图 8578. 1982.

一年生草本, 高 30—45 厘米。茎直立, 分枝, 被白粉。叶片线状披针形, 中部叶较大, 长 2—4 厘米, 宽 2—5 毫米, 顶端急尖或钝, 基部渐狭, 两面无毛。圆锥状聚伞花序疏展; 花直径约 12 毫米; 花梗细, 长 1—3 厘米; 苞片三角形, 边缘膜质; 花萼钟形, 长 3—4 毫米, 萼齿裂至中部, 卵形, 顶端圆, 边缘膜质; 花瓣白色或粉红色, 长圆形, 长为花萼的 2—3 倍, 顶端截形或微凹, 基部急狭; 雄蕊比花瓣短; 子房卵球形, 花柱短。蒴果卵球形, 长于宿存萼; 种子直径 1.2 毫米, 具钝瘤。花期 5—6 月, 果期 7 月。

我国常栽培供观赏。欧洲至高加索、土耳其东部、伊朗也有。模式标本采自高加索。

组 5. 长胚根组 Sect. *Macrorrhizaea* Boiss., Fl. Orient. 1: 536. 1867.

一年生草本。茎毛发状。叶片宽少于 3 毫米。花萼倒圆锥筒状或长圆形。蒴果长圆形; 种子多而小, 具显著伸长的胚根。

我国产 1 种。

18. 细小石头花 (植物研究)

*Gypsophila muralis* L., Sp. Pl. 408. 1753; Ser. in DC. Prodr. 1: 354. 1824; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 288. 1842; Hegi, Illustr. Fl. Mittel-Europ. 3: 310. taf. 101. fig. 2. u. fig. 579 (r, s, t). 1912; Fiori, Icon. Fl. Ital. 149. fig. 1203. 1921; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 774. 1936; Bailey, Man. Cult. Pl. 381. 1949; Байтенов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 411. 1960; Barkoudah in Wentia 9: 144. pl. 15. fig. 46—51. 1962; Barkoudah et Chater in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 184. 1964; 东北草本植物志 3: 53. 1975.

一年生草本, 高 5—20 厘米。茎自基部开始分枝, 被微柔毛, 上部无毛。叶片线形, 长 5—25 毫米, 宽 1—2.5 毫米, 急尖或钝, 基部变狭, 苍白色。二歧聚伞花序疏散; 花梗细, 直挺, 长为花萼的多倍; 苞片叶状; 花萼倒圆锥筒状, 长 3—4 毫米, 宽 0.5—2.5 毫米, 萼齿裂至 1/4 或 1/3, 圆形, 顶端啮蚀状; 花瓣粉红色, 脉色较深, 倒卵状楔形, 长为花萼的 1.5—2 倍, 顶端啮蚀状; 雄蕊与花瓣等长或稍长; 子房卵球形, 花柱短。蒴果长圆形, 比宿存萼长; 种子细小, 多数, 歪卵形, 直径 0.3—0.5 毫米, 黑色, 具条状凸起。花期 5—10 月。