

方伸展,下缘直,长1—1.3厘米;花瓣无毛,瓣片短,顶端圆,几无距;雄蕊无毛,花丝全缘;心皮3,子房被绢状短柔毛。蓇葖长约1.4厘米,被短柔毛;种子倒圆锥状三角形,长约2毫米,有横狭翅。8—10月开花。

产云南西北部。生海拔2800—3800米间山地草坡。模式标本采自云南丽江。

#### 4b. 弯短距乌头(变种)

*Aconitum brevicalcaratum* var. *lauenerianum* (Fletcher) W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊1: 59. 1965.——*A. lauenerianum* Fletcher in Not. Bot. Gard. Edinb. 20: 187. 1950.

与短距乌头的区别:花瓣有明显的向后弯的短距。

分布于云南西北部、四川西南部(木里)。生海拔3500—4000米间山地草坡。模式标本采自云南丽江。

#### 5. 花葶乌头 一口血(湖北西部) 图版27: 1—6

*Aconitum scaposum* Franch. in Morot, Journ. Bot. 8: 277. 1894; 中国高等植物图鉴 1: 686, 图1372. 1972; 秦岭植物志 1(2): 255. 1974.——*A. scaposum* var. *pyramidale* Franch. l. c.——*A. lycoctonum* L. var. *ranunculoides* Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 502. 1904.——*A. scaposum* var. *efoliatum* Rapaics in Növ. Közl. 6: 168. 1907.——*A. scaposum* var. *patentipilum* W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊1: 60. 1965.

根近圆柱形,长约10厘米,粗约0.8厘米。茎高35—67厘米,稍密被反曲(偶而开展)的淡黄色短毛,不分枝或分枝。基生叶3—4,具长柄;叶片肾状五角形,长5.5—11厘米,宽8.5—22厘米,基部心形,三裂稍超过中部,中裂片倒梯状菱形,急尖,稀渐尖,不明显三浅裂,边缘有粗齿,侧裂片斜扇形,不等二浅裂,两面有短伏毛;叶柄长13—40厘米,基部有鞘。茎生叶小,2—4,有时不存在,集中在近茎基部处,长达7厘米,叶片长达2厘米,或完全退化,叶柄鞘状。总状花序长(20—)25—40厘米,有15—40花;苞片披针形或长圆形;花梗长1.4—3.4厘米,被开展的淡黄色长毛;小苞片生花梗基部,似苞片,但较短;萼片蓝紫色,外面疏被开展的微糙毛,上萼片圆筒形,高1.3—1.8厘米,外缘近直,与向下斜展的下缘形成尖喙;花瓣的距疏被短毛或无毛,比瓣片长2—3倍,拳卷;雄蕊无毛,花丝全缘;心皮3,子房疏被长毛。蓇葖不等大,长0.75—1.3厘米;种子倒卵形,长约1.5毫米,白色,密生横狭翅。8—9月开花。

分布于四川、贵州北部、湖北、江西东部(铅山)、陕西南部、河南西南部。生海拔