

50. 雅江乌头 图版 41: 3—4

Aconitum yachiangense W. T. Wang in Addenda.

茎高约 1 米，有开展的短柔毛，上部分枝。叶五角形，宽约 10 厘米，三深裂，中深裂片菱形，渐尖，近羽状浅裂，侧深裂片斜扇形，不等二裂，两面疏被短柔毛。复总状花序圆锥状；轴和花梗都密被淡黄色短柔毛，并混生短腺毛；苞片叶状；花梗长 2—3.3 厘米；小苞片生花梗中部之上，叶状；萼片白色，干时淡紫色，外面有开展的短柔毛，上萼片盔形，有爪，高约 2 厘米，自基部至喙长约 1.5 厘米，下缘斜上方展，凹，喙向下伸展，侧萼片圆倒卵形，长约 1.4 厘米，下萼片长约 1.2 厘米；花瓣疏被柔毛，瓣片长约 1 厘米，唇和距都长约 4 毫米；雄蕊无毛；心皮 5，子房密被淡黄色柔毛。
5 月开花。

产我国四川西部雅江。生海拔 3100—3400 米间山地。

稍近波密乌头 *A. pomeense*，但萼片外面有开展的短柔毛，上萼片盔形，花瓣疏被柔毛，爪不膝状弯曲，子房密被柔毛，可以区别。

51. 聂拉木乌头 图版 44: 7—9；图版 45: 2

Aconitum nielamuense W. T. Wang in Addenda.

块根狭倒圆锥形或胡萝卜形，长 3.5—6.5 厘米，粗约 1.2 厘米。茎高 60—150 厘米，粗 4—10 毫米，下部无毛，上部有反曲的短柔毛，有少数短分枝或不分枝。茎下部叶在开花时枯萎。中部叶有稍长柄，叶片宽五角形，长约 7 厘米，宽约 9.5 厘米，三深裂至距基部 5—8 毫米处，中央深裂片菱形，急尖，三裂，二回裂片有缺刻状三角形小裂片，侧深裂片斜扇形，不等二深裂，两面有稀疏短伏毛。总状花序长 6.5—30 厘米，有 6—28 花；轴和花梗都密被开展的淡黄色柔毛和短腺毛；下部花梗长 2.5—6.5 厘米，上部花梗长约 2 厘米；小苞片生花梗下部或上部，叶状；萼片灰蓝紫色，外面稍密被短柔毛，上萼片船形，对称，自基部至喙长 1.8—2.4 厘米，中部宽 1—1.2 厘米，侧萼片长 1.5—1.7 厘米，下萼片长约 1 厘米；花瓣有疏柔毛，唇长约 4 毫米，微凹，距长约 1.5 毫米，稍向后弯曲；雄蕊无毛；心皮 5，子房有密柔毛。
8—9 月开花。

产我国西藏南部(聂拉木)。生海拔 3400—3900 米间山坡林边或灌丛中。

本种近雅江乌头 *A. yachiangense*，但上萼片船形，有极短的喙。也稍近波密乌头 *A. pomeense*，但花梗密被柔毛，萼片外面、花瓣和子房均有毛，花瓣的爪不膝状弯曲，可以区别。

52. 大渡乌头 图版 43: 6—8；图版 45: 3

Aconitum franchetii Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51:510,



1—3. 短梗墨脱乌头 *Aconitum elliotii* var. *doshongense* 1.花序;2.叶;3.花瓣。4—6. 加查乌头 *A. chiachaense* 4.花序;5.叶;6.花瓣。7—9. 壮拉木乌头 *A. nielamuense* 7.叶;
8.花;9.花瓣。10—11. 贡山乌头 *A. kungshanense* 10.叶;11.花。(王金凤绘)

究所); 同地, 桑堆乡, 海子山, 海拔 4600 米, 山坡, 1973 年 8 月 17 日, 四川植被调查队 3835。31 *Aconitum pulchellum* Hand.-Mazz. var. *racemosum* W. T. Wang, var. nov.

A. var. pulchello differt caulis patule puberulis, racemis elongatis ad 22 cm longis 5-9-floris, petalis filamentisque pilosis

云南(Yunnan): 德钦(Tehchin), 白芒雪山, 海拔 4200 米, 1976 年 8 月, 杨竞生, 无号(模式标本 Typus! 存云南省药品检验所)。

33. *Aconitum sinchiangense* W. T. Wang, sp. nov.

Fortasse *A. longipetiolato* Lauener affine, sed foliis ad basin triseptatis, bracteolis haud foliaceis minutis subulatis 2.5—4 mm longis, sepalo superiore angustiore falcato-naviculari, petalis glabris, eorum labiis angustioribus linearibus, carpellis glabris valde differt.

新疆(Sinchiang): 和硕(Hoshuo), 海拔 2620 米, 山坡, 1958 年 8 月 5 日, 新疆综合考察队 7080 (模式标本 Typus! 存中国科学院植物研究所)。

35. *Aconitum nagarum* var. *lasiandrum* W. T. Wang, var. nov.—? *A. subrosulatum* Hand.-Mazz. in Act Hort. Gothob. 13. 88 (1939)

A. var. typica differt filamentis superne luteo-puberulis, ovariis luteo-pubescentibus.

云南(Yunnan): 宣威(Hsiuanwei), 1964 年, 宣威药材公司, 无号(模式标本 Typus! 存卫生部药检所); 同地, 海拔 2800 米, 1972 年 10 月, 武素功, 无号。

50. *Aconitum yachiangense* W. T. Wang, sp. nov.

Affine *A. pomeensi* W. T. Wang, a quo differt sepalis extus patentim puberulis, eo superiore galeato, petalis sparse puberulis, eorum unguibus apice haud geniculatis, ovariis dense luteolo-pubescentibus

四川(Szechuan): 雅江(Yachiang), 孜河学校至江边, 海拔 3100—3450 米, 1960 年 5 月 5 日, 应俊生 3298 (模式标本 Typus! 存中国科学院植物研究所)。

51. *Aconitum nielamuense* W. T. Wang, sp. nov.

Affine *A. pomeensi* W. T. Wang, a quo differt pedicellis dense patentimque luteolo-pubescentibus, sepalis extus petiolisque puberulis, eorum unguibus apice haud geniculatis, ovariis dense pubescentibus.

西藏(Tibet): 聂拉木(Nielamu), 曲乡, 海拔 3400 米, 山坡, 1972 年, 8 月 27

日，西藏中草药队 1546 (模式标本 Typus: 存中国科学院植物研究所)；同地，海拔 3500—3900 米，1972 年 8 月至 9 月，西藏中草药队 1706, 1767。

52. *Aconitum franchetii* Finet et Gagnep. var. *villosum* W. T. Wang, var. nov

A. var. franchetii differt inflorescentis patentim puberulis, petalorum unguibus apice geniculatis differt.

四川西部 (W Szechuan): 无准确地点，吴中伦 12405 (模式标本 Typus: 存江苏省植物研究所)。

55. *Aconitum stylosoides* W. T. Wang, sp. nov.

Affine *A. styloso* Stapf, a quo differt pedicellis suberecto-patentibus albido-pubescentibus, sepalo superiore naviculare, filamentis superne puberulis, carpellis 3 (—4).

四川 (Szechuan): 稻城 (Taucheng), 蒙自乡，海拔 3500 米，云杉林边，1973 年 8 月 20 日，四川植被调查队 2586 (模式标本 Typus: 存中国科学院植物研究所)。

62. *Aconitum chiachaense* W. T. Wang, sp. nov

Affine *A. breviflimbo* Lauener, sed pedicellis brevioribus (1.5—3.5 cm longis), floribus minoribus, sepalo superiore galeato 1.5 cm alto a basi ad apicem circ. 1.4 cm longo, petalis glabris differt.

西藏 (Tibet): 加查 (Chiacha)，海拔 4500—4800 米，山坡，1972 年 8 月 29 日，西藏中草药队 4525 (模式标本 Typus: 存中国科学院植物研究所)。

***Aconitum chiachaense* var. *glandulosum* W. T. Wang, var. nov.**

A. var. chiachaensi differt caulis carpellisque patule puberulis, racemis patule glanduloso-puberulis, filamentis pilosis.

西藏 (Tibet): 加查 (Chiacha)，海拔 4400 米，垫状圆柏灌丛中，花紫色，1976 年 9 月 18 日，青藏调查队林业组 1955 (模式标本 Typus: 存中国科学院植物研究所)。

68' *Aconitum dolichorhynchum* W. T. Wang, sp. nov.

Affine *A. rockii* Fletcher et Lauener, a quo racemis brevioribus (circ. 6 cm longis) paucifloris pilis albis tectis, pedicellis brevioribus 1—3 cm longis, sepalo superiore naviculari-galeato longe unguiculato et longius rostrato, carpellis glabris differt.

云南 (Yunnan): 德钦 (Tehchin)，奔子栏，1976 年 8 月 10 日，杨竞生，无号 (模