

或低盔形,高1.5—2厘米,自基部至喙长约1.7厘米,下缘稍凹,侧萼片长1.5—1.7厘米;花瓣的爪有疏柔毛,唇长约5毫米,微凹,距长约1.5毫米,稍向后弯曲;花丝有疏柔毛;心皮5,子房密被淡黄色柔毛。9月开花。

在我国产西藏南部亚东一带。生海拔4000米山坡灌丛中。在锡金也有分布。

块根有毒,可供药用,治风湿性关节炎等症(西藏常用中草药)。

《西藏常用中草药》图186是亚东乌头的图,可以参考,但在这书中拉丁名误定为 *Aconitum balfourii* Stapf.

61. 短唇乌头

Aconitum brevilibum Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 25: 22, f. 3D, 4G. 1963.

块根圆柱形,长6厘米,粗1.5厘米。茎直立,高50—150厘米,上和花序均密被弯曲而紧贴的黄色短柔毛。茎下部叶有长柄,上部叶有短柄;叶片宽卵形或圆形,长约8厘米,宽8—10厘米,基部心形,三深裂至距基部1厘米处,中央深裂片宽菱形,上部三裂近中部,浅裂片具1—2枚卵形小裂片,侧深裂片斜扇形,不等二深裂,背面只沿脉疏被短柔毛;最下部叶柄长达18厘米,被短柔毛,变无毛。花序长达55厘米,稀疏;苞片除最上部的以外均为叶状;花梗长达15厘米,近直展;小苞片生花梗中部或中部稍上方,下部花梗的小苞片叶状,上部花梗的小,披针形;萼片蓝堇色或暗红色,外面被短柔毛,上萼片船形,高2厘米,中部以上最宽处宽1厘米,自基部至喙长2.5厘米,喙短,侧萼片长2厘米,下萼片长1.5厘米;花瓣稍密被短毛,与上萼片等长,唇短,微凹,距短,向后弯曲;花丝被短毛,有小齿;心皮3,子房被紧贴的绢状短柔毛。7月开花。

产西藏东部(墨脱)。生海拔3300米一带冷杉林中的株伐迹地或海拔4270米一带多石砾山坡。

62. 加查乌头 图版44: 4—6; 图版45: 10

Aconitum chiachaense W. T. Wang in Addenda.

块根近圆柱形,长约4厘米,粗约7毫米。茎高40—45厘米,上部有稀疏反曲的短柔毛,其他部分无毛,不分枝或有1分枝。茎中部叶有稍长柄;叶片心状五角形,长约3.4厘米,宽约6厘米,三深裂至距基部3.5毫米处,中央深裂片菱形,三浅裂,二回裂片有卵形牙齿,侧深裂片斜扇形,不等二裂,无毛;叶柄长约4.5厘米。花序长5.5—10厘米,有4—5花;轴和花梗密被白色反曲的短柔毛;下部苞片叶状;花梗向上近直展,长1.5—3.5厘米;小苞片生花梗下部或中部,线形,长3—6毫米;萼片蓝