

或低盔形，高 1.5—2 厘米，自基部至喙长约 1.7 厘米，下缘稍凹，侧萼片长 1.5—1.7 厘米；花瓣的爪有疏柔毛，唇长约 5 毫米，微凹，距长约 1.5 毫米，稍向后弯曲；花丝有疏柔毛；心皮 5，子房密被淡黄色柔毛。9 月开花。

在我国产西藏南部亚东一带。生海拔 4000 米山坡灌丛中。在锡金也有分布。块根有剧毒，可供药用，治风湿性关节炎等症（西藏常用中草药）。

《西藏常用中草药》图 186 是亚东乌头的图，可以参考，但在这书中拉丁名误定为 *Aconitum balfourii* Stapf.

### 61. 短唇乌头

*Aconitum breviliimum* Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 25: 22, f. 3D, 4G. 1963.

块根圆柱形，长 6 厘米，粗 1.5 厘米。茎直立，高 50—150 厘米，上部和花序均密被弯曲而紧贴的黄色短柔毛。茎下部叶有长柄，上部叶有短柄；叶片宽卵形或圆形，长约 8 厘米，宽 8—10 厘米，基部心形，三深裂至距基部 1 厘米处，中央深裂片宽菱形，上部三裂近中部，浅裂片具 1—2 枚卵形小裂片，侧深裂片斜扇形，不等二深裂，背面只沿脉疏被短柔毛；最下部叶柄长达 18 厘米，被短柔毛，变无毛。花序长达 55 厘米，稀疏；苞片除最上部的以外均为叶状；花梗长达 15 厘米，近直展；小苞片生花梗中部或中部稍上方，下部花梗的小苞片叶状，上部花梗的小，披针形；萼片蓝堇色或暗红色，外面被短柔毛，上萼片船形，高 2 厘米，中部以上最宽处宽 1 厘米，自基部至喙长 2.5 厘米，喙短，侧萼片长 2 厘米，下萼片长 1.5 厘米；花瓣稍密被短毛，与上萼片等长，唇短，微凹，距短，向后弯曲；花丝被短毛，有小齿；心皮 3，子房被紧贴的绢状短柔毛。7 月开花。

产西藏东部（墨脱）。生海拔 3300 米一带冷杉林中的株伐迹地或海拔 4270 米一带多石砾山坡。

### 62. 加查乌头 图版 44: 4—6; 图版 45: 10

*Aconitum chiachaense* W. T. Wang in Addenda.

块根近圆柱形，长约 4 厘米，粗约 7 毫米。茎高 40—45 厘米，上部有稀疏反曲的短柔毛，其他部分无毛，不分枝或有 1 分枝。茎中部叶有稍长柄；叶片心状五角形，长约 3.4 厘米，宽约 6 厘米，三深裂至距基部 3.5 毫米处，中央深裂片菱形，三浅裂，二回裂片有卵形牙齿，侧深裂片斜扇形，不等二裂，无毛；叶柄长约 4.5 厘米。花序长 5.5—10 厘米，有 4—5 花；轴和花梗密被白色反曲的短柔毛；下部苞片叶状；花梗向上近直展，长 1.5—3.5 厘米；小苞片生花梗下部或中部，线形，长 3—6 毫米；萼片蓝

色，外面疏被短柔毛，上萼片盔形，高约 1.5 厘米，自基部至喙长约 1.4 厘米，下缘稍凹，侧萼片斜宽倒卵形，长约 1.3 厘米，下萼片长约 1 厘米；花瓣无毛，唇长约 3.5 毫米，距长约 2 毫米，向后下方强烈弯曲；雄蕊无毛；心皮 4—5，子房有白色短柔毛。8 月开花。

产我国西藏加查。生海拔 4500—4800 米间山地山坡上。

稍近短唇鸟头 *A. breviliimum*，但花梗较短，花较小，上萼片盔形，花瓣无毛，可以区别。

#### 62b. 腺毛加查鸟头(变种)

*Aconitum chiachaense* var. *glandulosum* W. T. Wang in Addenda.

与加查鸟头的区别：茎和心皮有开展的短柔毛；花序有开展的腺毛；花丝有疏毛。

产西藏加查。生海拔 4400 米一带山地垫状圆柏灌丛中。

#### 63. 茨开鸟头 图版 42: 8—10

*Aconitum souliei* Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 515, pl. 9, B. 1904.—*A. souliei* var. *pumilum* Finet et Gagnep. l. c.

块根倒圆锥形，长 1—1.4 厘米，直径 4—6 毫米。茎高 25—50（—70）厘米，下部变无毛，上部疏被反曲的短柔毛，或混生少数伸展的柔毛。基生叶 1 枚，与茎最下部叶在开花时常枯萎，具长柄，茎中部叶有稍长柄；叶片五角形或五角状肾形，长 2.4—5 厘米，宽 4.5—7 厘米，三深裂至距基部 5—8 毫米处，中央深裂片宽菱形或倒梯状菱形，侧深裂片斜扇形，比中深裂片宽约 2 倍，不等二或三裂，表面被短伏毛，背面疏被短柔毛或变无毛。总状花序生茎或分枝顶端，长 3—5 厘米，有 3—5 花；轴和花梗密被伸展的淡黄色短柔毛或同时混生反曲的短柔毛；最下部苞片叶状，其他苞片线形；花梗近直展，长 0.5—1 厘米；小苞片生花梗下部，狭线形，长 2.5—5 毫米；萼片黄色，外面稍密被淡黄色短柔毛，上萼片盔形或船状盔形，自基部至喙长 1.6—1.9 厘米，宽约 7 毫米，喙短；花瓣的爪多少密被柔毛，唇长约 5 毫米，疏被柔毛，距长约 1 毫米，球形，向后弯，无毛；花丝无毛或上部疏被柔毛，全缘；心皮 5，子房密被褐黄色长柔毛。8 月开花。

产我国云南西北部德钦一带。生海拔 3800—3900 米山地草坡。

本种近显柱鸟头 *A. stylosum* 和独龙鸟头 *A. taronense*，但萼片为黄色可以区别。

#### 64. 木里鸟头

*Aconitum phyllostegium* Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 110.



1—3. 短梗墨脱乌头 *Aconitum elliotii* var. *doshongense* 1.花序;2.叶;3.花瓣。4—6. 加查乌头 *A. chiachaense* 4.花序;5.叶;6.花瓣。7—9. 壮拉木乌头 *A. nielamuense* 7.叶;  
8.花;9.花瓣。10—11. 贡山乌头 *A. kungshanense* 10.叶;11.花。(王金凤绘)



块根(原大) 1.匙苞乌头 *Aconitum spathulatum*; 2.聂拉木乌头 *A. nielamuense*; 3.大渡乌头 *A. franchetii*; 4.显柱乌头 *A. stylosum*; 5.独龙乌头 *A. taronense*; 6.康定乌头 *A. tatsienense*; 7.墨脱乌头 *A. elliotii*; 8.亚东乌头 *A. spicatum*; 9.贡山乌头 *A. kungshanense*; 10.加查乌头 *A. chiachaense*; 11.太白乌头 *A. taipaicum*; 12.直缘乌头 *A. transsectum*; 13.米林乌头 *A. milinense*; 14.腋花乌头 *A. sinoaxillare*。(王文采绘)

日，西藏中草药队 1546 (模式标本 Typus: 存中国科学院植物研究所)；同地，海拔 3500—3900 米，1972 年 8 月至 9 月，西藏中草药队 1706, 1767。

**52. *Aconitum franchetii* Finet et Gagnep. var. *villosum* W. T. Wang, var. nov**

*A. var. franchetii* differt inflorescentis patentim puberulis, petalorum unguibus apice geniculatis differt.

四川西部 (W Szechuan): 无准确地点，吴中伦 12405 (模式标本 Typus: 存江苏省植物研究所)。

**55. *Aconitum stylosoides* W. T. Wang, sp. nov.**

Affine *A. styloso* Stapf, a quo differt pedicellis suberecto-patentibus albido-pubescentibus, sepalo superiore naviculare, filamentis superne puberulis, carpellis 3 (—4).

四川 (Szechuan): 稻城 (Taucheng), 蒙自乡，海拔 3500 米，云杉林边，1973 年 8 月 20 日，四川植被调查队 2586 (模式标本 Typus: 存中国科学院植物研究所)。

**62. *Aconitum chiachaense* W. T. Wang, sp. nov**

Affine *A. breviflimbo* Lauener, sed pedicellis brevioribus (1.5—3.5 cm longis), floribus minoribus, sepalo superiore galeato 1.5 cm alto a basi ad apicem circ. 1.4 cm longo, petalis glabris differt.

西藏 (Tibet): 加查 (Chiacha)，海拔 4500—4800 米，山坡，1972 年 8 月 29 日，西藏中草药队 4525 (模式标本 Typus: 存中国科学院植物研究所)。

***Aconitum chiachaense* var. *glandulosum* W. T. Wang, var. nov.**

*A. var. chiachaensi* differt caulis carpellisque patule puberulis, racemis patule glanduloso-puberulis, filamentis pilosis.

西藏 (Tibet): 加查 (Chiacha)，海拔 4400 米，垫状圆柏灌丛中，花紫色，1976 年 9 月 18 日，青藏调查队林业组 1955 (模式标本 Typus: 存中国科学院植物研究所)。

**68' *Aconitum dolichorhynchum* W. T. Wang, sp. nov.**

Affine *A. rockii* Fletcher et Lauener, a quo racemis brevioribus (circ. 6 cm longis) paucifloris pilis albis tectis, pedicellis brevioribus 1—3 cm longis, sepalo superiore naviculari-galeato longe unguiculato et longius rostrato, carpellis glabris differt.

云南 (Yunnan): 德钦 (Tehchin)，奔子栏，1976 年 8 月 10 日，杨竞生，无号 (模