

1939.

块根椭圆球形，长约 1.5 厘米。茎高约 1 米，无毛，上部有短分枝。茎下部叶和中部叶有长柄，叶片心状五角形，长约达 5.8 厘米，宽约 8 厘米，三深裂至距基部 6—9 毫米处，中央深裂片菱形，渐尖，羽状分裂近中部，小裂片狭三角形，侧深裂片斜扇形，不等二深裂，表面有稀疏的短曲柔毛，背面无毛；茎下部叶的叶柄比叶片长，上部的渐变短。总状花序生茎和分枝顶端，有 5—7 花，无毛；下部苞片叶状，其他的线形；花梗长达 3 厘米，稍弯曲；小苞片生花梗下部或中部，近钻形，长约 5 毫米；萼片蓝紫色，外面无毛，上萼片高盔形，高 2—2.5 厘米，下缘稍向上斜展，直，长约 2 厘米，喙不明显，侧萼片圆倒卵形，长约 1.8 厘米，下萼片卵形或近披针形；花瓣无毛，唇，舌形，长约 7 毫米，末端二浅裂，距长约 4 毫米，向后近拳卷状弯曲；雄蕊无毛；心皮 3，无毛。8 月开花。

产湖北西部兴山一带。生海拔 2800 米一带山地。

71. 太白乌头 金牛七(陕西太白山) 图版 45: 11; 图版 46: 13

*Aconitum taipaicum* Hand.-Mazz. in *Acta Hort. Gothob.* 13: 121.  
1939; 陕西中草药 508, 图 273. 1971; 秦岭植物志 1 (2): 257, 图 219. 1974.


块根倒卵球形或胡萝卜形，长 1.5—3 厘米。茎高 35—60 厘米，上部被反曲并紧贴的短柔毛，等距地生叶，上部分枝。茎下部叶在开花时枯萎。茎中部叶的叶片五角形，长 3.5—5.5 厘米，宽 5—7 厘米，三深裂至距基部 2.5—5 毫米处，中央深裂片宽菱形，近羽状分裂，侧深裂片斜扇形，不等二深裂，两面疏被短柔毛；叶柄长约 22 厘米，被反曲的短柔毛，无鞘。总状花序生茎及分枝顶端，有 2—4 花；轴和花梗均被反曲的短柔毛；苞片三裂或长圆形；花梗长 1.5—2.5 厘米，近直展，顶端向下弯曲；小苞片生花梗中部，线形，长 0.6—1.1 厘米，宽约 0.5 毫米；萼片蓝色，上萼片外面无毛，盔形，具不明显的爪，高约 1.7 厘米，自基部至喙长约 1.5 厘米，下缘稍凹，喙短；花瓣无毛，瓣片长约 8 毫米，唇长约 3.5 毫米，距小，长约 1 毫米，向后弯曲；雄蕊无毛，花丝有 2 小齿；心皮 5，子房无毛或疏被短柔毛。蓇葖长约 8 毫米；种子三棱形，只在一面密生横翅。9 月开花。

产陕西南部(秦岭)、河南西部(栾川)。生海拔 2600—3400 米高山草地。


根有大毒，供药用，治风湿性关节炎、跌打损伤等症(陕西中草药)。

《陕西中草药》图 273，以及《秦岭植物志》1 卷 2 册，图 219 都是太白乌头的图，可以参考。

72. 直缘乌头 大草乌、小黑牛(云南丽江) 图版 39: 6—8; 图版 45: 12



块根(原大) 1.匙苞乌头 *Aconitum spathulatum*; 2.聂拉木乌头 *A. nielamuense*; 3.大渡乌头 *A. franchetii*; 4.显柱乌头 *A. stylosum*; 5.独龙乌头 *A. taronense*; 6.康定乌头 *A. tatsienense*; 7.墨脱乌头 *A. elliotii*; 8.亚东乌头 *A. spicatum*; 9.贡山乌头 *A. kungshanense*; 10.加查乌头 *A. chiachaense*; 11.太白乌头 *A. taipaicum*; 12.直缘乌头 *A. transsectum*; 13.米林乌头 *A. milinense*; 14.腋花乌头 *A. sinoaxillare*。(王文采绘)



1—2.长枝乌头 *Aconitum longiramosum* 1.茎生叶；2.花序；3.花瓣。4—6.拟康定乌头 *A. rockii* 4.茎中部叶；5.花；6.花瓣。7—8.全裂乌头 *A. pseudodivaricatum* 7.茎生叶；8.聚合果。9—10.垂果乌头 *A. pendulicarpum* 9.花；10.花瓣。11—12.草黄乌头 *A. straminiflorum* 11.花；12.花瓣。13.太白乌头 *A. taipaicum* 花。(冯晋庸绘)