

花瓣无毛，瓣片长5—7毫米，唇长约2.5毫米，距近球形，长1—1.5毫米，爪顶部有时稍膝状弯曲；雄蕊长6—7毫米，无毛，花丝全缘；心皮5(—6)，子房被开展的短柔毛。7月开花。

产四川理县。生海拔3300米一带山地林中。

74. 长梗乌头

Aconitum longipedicellatum Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 25: 21, f. 3H, 4F. 1963.

茎高达80厘米，下部变无毛，上部被反曲的短柔毛。茎下部叶有长柄，上部叶具短柄；叶片无毛，心状五角形，长及宽达10厘米，三深裂至距基部5—7毫米处，中央深裂片菱形，急尖，三裂近中部，二回裂片有少数狭卵形小裂片和粗牙齿，侧深裂片斜扇形，不等二深裂稍超过中部；下部叶的叶柄长达25厘米。花序圆锥状，长达40厘米，稀疏，最下部分枝有3—4朵花；轴和花梗被短柔毛；中部以下的苞片叶状，花梗向上近直展，长3—9厘米，稍弧状弯曲；小苞片生花梗的中部之上或中部附近，下部花梗的小苞片叶状，上部花梗的小，披针形或线形；萼片蓝堇色，外面被短毛，上萼片近盔形，高约1.7厘米，自基部至喙长1.3—2厘米，下缘近直，喙短，侧萼片长及宽均为1.5厘米；花瓣的爪有短毛，距短，球形，向后伸展；花丝全缘或有小齿，被短毛；心皮5，子房被绢状短柔毛。8月开花。

产我国西藏东南部。生海拔4270米一带山地陡坡灌丛中。模式标本采自西藏朗县之南。

75. 绰斯甲乌头 图17

Aconitum chuosjiaense W. T. Wang in addenda.

茎高约1米，暗紫色，稍密被反曲并贴伏的短柔毛。茎中部叶有短柄；叶片五角形，长约6.5厘米，宽约9厘米，基部心形，三全裂几达基部，中央全裂片狭菱形，顶端长渐尖，在中部三裂，下部全缘，上部边缘有少数卵形或三角形小裂片或牙齿，侧全裂片斜扇形，不等二深裂，两面疏被短伏毛；叶柄长约2.4厘米。上部叶渐变小。总状花序长约12厘米，有9花；下部苞片叶状，上部的线形；花序轴和花梗密被反曲的短柔毛；花梗长达3.5厘米；小苞片生花梗中部之下，狭线形，长4—5毫米，宽约0.4毫米；萼片淡紫色，外面沿下缘和后面有疏短曲毛，其他部分近无毛，上萼片盔形，高约1.7厘米，自基部至喙长约1.4厘米，侧萼片宽斜倒卵形，长1.4厘米，下萼片线形或狭线形，长约1厘米，宽2或1毫米；花瓣的瓣片长约9毫米，唇长约4.5毫米，有疏柔毛，末端二裂，距近球形，长约1.1毫米，向后伸出；雄蕊无毛，花丝全缘；心皮4，