

毛或偶而子房有柔毛。蓇葖直,长1.2—1.5厘米,喙长约2.5毫米;种子三棱形,长约3毫米,沿棱有狭翅并有横膜翅。8—10月开花。

分布于四川、湖北、湖南北部、江西北部、浙江西北部、安徽西部、陕西南部、河南西部。生海拔1700—2200米山地林中或灌丛中。模式标本采自湖北房县。

块根民间药用,治跌打损伤,关节疼痛(湖北西部)。

本种与弯果乌头 *A. refracticarpum* 极为相近,但小苞片较小,线形,花瓣无毛,蓇葖直,可以区别。本种也近粗茎乌头 *A. crassicaule*,但上萼片高盔形,而与后者有别。在乌头属藤本种类中,这三种叶子分裂的程度最小,通常掌状三裂稍超过中部,中深裂片梯状菱形,不明显三浅裂,边缘上部有少数粗牙齿。

80b. 拳距瓜叶乌头 草乌、血乌(峨眉山) 图版48: 5

*Aconitum hemsleyanum* var. *circinatum* W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊1: 76. 1965.

与瓜叶乌头的区别: 花瓣的距长4—6毫米,拳卷。

分布于四川西部(峨眉、峨边)、云南西北部、贵州西部(盘县)。生海拔2300—2900米间山地灌丛中。模式标本采自四川峨眉山。

块根供药用,外用治疥疮,擦无名肿毒,但伤口破皮后不能用(四川峨眉山)。

《药学学报》12卷10期,图版4有拳距瓜叶乌头的照片,可以参考。

80c. 长距瓜叶乌头 图版48: 6

*Aconitum hemsleyanum* var. *elongatum* W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊1: 77. 1965.

与瓜叶乌头的区别: 花瓣的距长约8毫米。

产四川天全二郎山一带。生海拔1900—3300米间山地、林边或林中。

80d. 截基瓜叶乌头

*Aconitum hemsleyanum* var. *chingtungense* (W. T. Wang) W. T. Wang, st. nov. — *A. chingtungense* W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊1: 77. 1965.

与瓜叶乌头的区别: 叶基部近截形;蓇葖的喙长5—5.5毫米。

产云南景东。生海拔3100米山地。

80e. 展毛瓜叶乌头(变种)

*Aconitum hemsleyanum* var. *atropurpureum* (Hand.-Mazz.) W. T. Wang, st. nov. — *A. atropurpureum* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob.