

形，长 5.5—8 厘米，宽 10—11 厘米，三深裂至距基部 4—6 毫米处，中央深裂片宽菱形，渐尖或长渐尖，近羽状深裂，侧深裂片斜扇形，不等二深裂，表面疏被紧贴短柔毛，背面几无毛；叶柄与叶片近等长或稍短。顶生总状花序长 50—85 厘米，稀疏，有 16—19 朵花；轴和花梗密被反曲的淡黄色短柔毛；苞片大部叶状，只上部苞片小，线形；花梗长 2.2—7 厘米，斜展；小苞片生花梗下部至上部，线形，长 6—10 毫米，宽 0.4—1 毫米；萼片蓝紫色，外面稍密被短柔毛，上萼片盔形，高约 2.2 厘米，自基部至喙长 2—2.2 厘米，在中部以上最宽处宽 1—1.4 厘米，下缘稍凹，喙短；花瓣无毛，爪顶端膝状弯曲，瓣片长约 8 毫米，唇长约 5 毫米，末端二浅裂，距长约 3 毫米，近拳卷；雄蕊无毛，花丝全缘，稀有 1—2 枚小齿；心皮 5，无毛。 8 月开花。

产云南西北部(中甸哈巴山)。生海拔 3600 米山坡灌丛中。

本种很近似哈巴乌头 *A. chuianum*，但叶的深裂片较狭，分裂较深，花梗较长，有淡黄色柔毛，花瓣的爪膝状弯曲，可以区别。也稍近玉龙乌头 *A. stapfianum*，但叶的分裂程度较小，茎、花序和萼片外面都有短柔毛，花瓣的爪膝状弯曲而不同。

86. 拟哈巴乌头

Aconitum chuianum W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊 1: 80. 1965.

块根狭倒圆锥形，长 4.5—6 厘米，粗约 1.5 厘米。茎长 1.2—1.6 米，下部直立，上部缠绕，疏被反曲的短柔毛，等距离生叶，上部分枝。茎中部叶具稍长柄；叶片五角形，长约 7.8 厘米，宽约 11 厘米，基部心形，三深裂至距基部 2—3 毫米处，中央深裂片菱形，渐尖，三裂，二回裂片具少数卵形小裂片，侧深裂片斜扇形，不等二深裂，两面沿脉疏被短伏毛；叶柄长约 5 厘米，疏被短柔毛。顶生总状花序长 12—14 厘米，约有 11 花；轴和花梗密被反曲短柔毛；下部苞片叶状，上部的线形；花梗粗壮，与轴成钝角斜展，长 1—3 厘米；小苞片生花梗中部之上，线形，长 7—10 毫米；萼片深紫色，外面稍密被短柔毛，上萼片盔形，高约 1.5 厘米，自基部至喙长约 1.7 厘米，下缘近平展，稍凹，喙短，侧萼片宽倒卵形，长约 1.4 厘米；花瓣长约 1.8 厘米，无毛，瓣片长约 8.5 毫米，宽约 3.2 毫米，唇长约 4 毫米，微凹，距长约 1.5 毫米，向后弯；雄蕊无毛，花丝全缘；心皮 5，无毛。 8 月开花。

产我国云南中甸哈巴山。生海拔 3800 米山坡灌丛中。

87. 藏南藤乌

Aconitum elwesii Stapf in Ann. Bot. Gard. Calc. 10: 174, pl. 112, A. 1905.