

块根纺锤形,长约1.5厘米,粗5毫米。茎高30厘米或更高,下部无毛,上部有开展的短柔毛,不分枝或分枝。茎中部叶的叶片五角形,宽3.5—8厘米,三全裂,近二回羽状深裂,末回小裂片线形或线状披针形,宽1—2.5毫米,顶端尖锐,表面有疏柔毛或无毛,背面有短柔毛;叶柄长0.8—2厘米,有开展的柔毛。花序伞房状,有3—5花;花梗长约2.5厘米,有开展的柔毛;萼片两面均有开展的疏柔毛,上萼片船形,下缘凹,长1.5—2.2厘米,侧萼片长0.9—1.5厘米,下萼片长1.2—1.3厘米;花瓣有短毛,瓣片长约9毫米,距向后弯曲;雄蕊无毛;心皮3,有疏柔毛或变无毛。蓇葖长约1.2厘米。10月开花。

产我国台湾梨山一带山地。

雪山乌头 *A. yamamotoanum* Ohwi (in Rep. Sp. Nov. 36: 49. 1934) 极近本种,但心皮有长柔毛可以区别,产我国台湾雪山。葇荑乌头 *A. bartlettii* Yamamoto (in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 20: 98. 1930) 也近本种,但心皮和花丝有柔毛可以区别,产我国台湾葇荑主山。

105. 锐裂乌头

Aconitum kojimae Tamura in Acta Phytotax. Geobot. 18: 64. 1959.

块根倒圆锥形,长3—4.5厘米,粗1.2—1.6厘米。茎高20—80厘米,下部无毛,上部疏被反曲的短柔毛,不分枝,等距地生叶。茎下部叶在开花时枯萎,中部叶有稍长柄;叶片五角形,基部心形,长3—9厘米,宽4—10厘米,三全裂,中央全裂片菱形,渐尖,近羽状深裂,小裂片狭披针形,顶端锐尖,全缘或具1枚牙齿,两面沿脉被紧贴的短柔毛,侧全裂片斜扇形,不等二深裂;叶柄长2—3厘米。花序伞房状,有3—7朵花;轴和花梗被反曲的短柔毛;下部苞片叶状;花梗长2—3厘米;小苞片生花梗中部之下,线形,长2—6毫米,被反曲的短柔毛;萼片外面被短柔毛,上萼片高盔形,高约1.4厘米,自基部至喙长约1.3厘米,下缘稍凹,侧萼片长1—1.2厘米;下萼片长1—1.2厘米;花瓣被短柔毛,瓣片长6.5—10毫米,距向后弯曲;花丝被短柔毛,有2小齿;心皮3,无毛或疏被短柔毛。蓇葖长0.7—1.1厘米;种子有膜质横翅。8月开花。

产我国台湾南部关山和卑南主山一带山地。

105b. 分枝锐裂乌头(变种) 图版57: 1—3

Aconitum kojimae var. *ramosum* Tamura in Acta Phytotax. Geobot. 18: 64. 1959.

与锐裂乌头的区别:茎较高,上部有分枝;花较大,上萼片高2.1—2.4厘米。