

中。

135b. 展毛拟缺刻乌头(变种)

*Aconitum sinonapelloides* var. *weisiense* W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊 1: 87. 1965.

与拟缺刻乌头的区别: 花梗上部有开展的短柔毛; 子房表面全部密被短柔毛。

产云南西北部(维西)。生海拔 3500 米山地沟边。

《植物分类学报》增刊 1, 图版 5 中有本种植物的照片, 可以参考。

136. 短瓣乌头 图版 68: 1—3

*Aconitum brevipetalum* W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊 1: 88, 图版 5, 图 19. 1965.

块根胡萝卜形, 长 2—3.4 厘米, 粗约 4.5 毫米。茎高 40—45 厘米, 下部无毛, 上部疏被反曲而紧贴的短柔毛, 等距地生 6—7 枚叶, 不分枝。茎最下部叶在开花时枯萎。茎中部叶有稍长柄; 叶片圆五角形, 长 4.2—5.5 厘米, 宽 6.5—9 厘米, 三全裂, 中央全裂片宽菱形或菱形, 渐尖, 羽状深裂, 表面疏被短伏毛, 背面无毛; 叶柄与叶片近等长或较短。总状花序长 3—7 厘米, 约有 5 花; 轴和花梗密被反曲而紧贴的短柔毛; 苞片叶状; 花梗长 0.6—3.4 厘米; 小苞片距花 3 毫米, 线形, 长 5—8.5 毫米, 宽 0.6—1 毫米, 无毛; 萼片淡绿色, 外面无毛, 上萼片船形, 宽约 5.5 毫米, 自基部至喙长约 1.4 厘米, 下缘稍凹, 外缘斜, 侧萼片长约 1 厘米, 顶端微尖; 花瓣长约 6 毫米, 无毛, 爪长约 4.6 毫米, 顶端膝状弯曲, 唇长约 2 毫米, 距短, 半球形; 雄蕊无毛, 花丝全缘; 心皮 3, 无毛。7 月开花。

产云南西北部(维西)。生海拔 4000 米山地溪边。

本种外形似拟缺刻乌头 *A. sinonapelloides*, 但花序有稀疏的花, 萼片较小, 绿色, 侧萼顶端微尖, 花瓣极小, 可以区别。

137. 剑川乌头

*Aconitum handelianum* Comber in Not. Bot. Gard. Edinb. 18: 224. 1934; Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 93. 1939.

块根胡萝卜形, 长约 4 厘米, 粗约 7 毫米。茎高 40—60 厘米, 基部细, 密被短柔毛。茎下部叶聚集在茎基部, 具长柄, 无毛; 叶片宽心形或近肾形, 长达 4.5 厘米, 宽达 7 厘米, 掌状五全裂, 全裂片近等大, 二或三回细裂, 末回裂片线形, 宽 0.5—2.5 毫米, 顶端急尖; 叶柄细, 长 6—12 厘米。茎基部以上叶具短柄, 稍密被短柔毛。顶生总状花序长约 16 厘米, 约有 20 花, 被伸展的黄色短腺毛及少数弯曲的白色短柔毛; 下部



1—3. 短瓣乌头 *Aconitum brevipetalum* 1.植株外形;2.花被;3.雄蕊。

4. 马尔康乌头 *A. liljestrandii* var. *falcatum* 花。(王金凤绘)