

0.8—3.2 厘米。总状花序有 7 至多朵密集的花；轴和花梗密被弯曲而紧贴的短柔毛，苞片叶状；花梗近直展，下部的长达 1.5 厘米，中部以上的长约 1 厘米；小苞片生花梗中部或上部，二或三浅裂，有时不分裂，宽线形长 5—9 毫米，宽 1.5—3.5 毫米；萼片紫蓝色，外面被短柔毛，上萼片盔形或盔状船形，具爪，高 2—3 厘米，下缘向斜上方伸展，喙短，侧萼片长 1.5—1.8 厘米；花瓣无毛，上部弯曲，瓣片长约 7 毫米，距短，向后弯曲；花丝疏被短毛，全缘或有 2 小齿；心皮 5，子房密被斜展的黄色长柔毛。9—10 月开花。

产我国云南西北部(丽江)及四川西南部。生海拔 2800—3700 米间山地草坡，有时生多石砾处。模式标本采自云南丽江。

在丽江用本植物的块根治感冒和头痛。

近缩梗乌头 *A. sessiliflorum*，但小苞片与花分开，上萼片船状盔形，可以区别。

152b. 展毛短柄乌头(变种) 雪上一支蒿(云南)

*Aconitum brachypodum* var. *laxiflorum* Fletcher et Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 20: 199. 1950.

与短柄乌头的区别：花序被伸展的短柔毛。

产云南北部(禄劝)和西北部(中甸)及四川西部。生海拔 3000—4300 米间山地草坡、多石山坡或陡崖上。模式标本采自四川木里。

块根有剧毒，供药用，治风湿关节痛、跌打损伤、外伤出血等症(云南中草药)。

152c. 曲毛短柄乌头(变种)

*Aconitum brachypodum* var. *crispulum* W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊 1: 97. 1965.

与短柄乌头的区别：小苞片披针状线形，长约 3 毫米，宽 0.8 毫米；心皮 3，子房密被贴伏的白色短柔毛。

产四川西北部(大金)。生海拔 3700 米一带山地。

153. 缩梗乌头 铁棒七(四川,若尔盖) 图版 73: 7—9

*Aconitum sessiliflorum* (Finet et Gagnep.) Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 88. 1939.—*A. napellus* L. var. *sessiliflorum* Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 513. 1904.—*A. rotundifolium* var. *sessiliflorum* (Finet et Gagnep.) Rapaics in Növ. Közl. 6: 163. 1907.

茎高 65—120(—150) 厘米，中部以下无毛，上部疏被反曲的短柔毛，密生叶，不