

小叶大, 坚纸质, 顶生小叶宽卵形, 有时近菱形, 长 5—10 厘米, 宽 3.5—9 厘米, 顶端急尖或微钝, 基部圆形、浅心形或截形, 三浅裂, 边缘每侧有 5—10 个不等粗齿, 表面叶脉近平, 背面叶脉隆起, 脉网明显, 小叶柄长 1.5—4 厘米; 叶柄长 4.5—6 厘米, 基部有鞘, 托叶狭, 全缘。花序圆锥状, 长 20—40 厘米; 花梗细, 长 3—7 毫米; 萼片白色, 宽椭圆形, 长 3—3.5 毫米, 早落; 雄蕊多数, 花药长圆形, 长 1—2 毫米, 花丝比花药窄或等宽, 长 5—7 毫米, 上部倒披针形, 下部丝形; 心皮 3—6, 花柱与子房等长, 稍拳卷, 沿腹面生柱头组织。瘦果狭卵形, 长 5—6 毫米, 约有 10 条细纵肋, 宿存花柱长约 1 毫米, 拳卷。 7—8 月开花。

分布于湖南(衡山)、江西、福建、浙江北部、江苏南部、安徽、河南南部(商城)。生海拔 600—1300 米间山地林下。模式标本采自浙江宁波。

根可药用, 治目红肿痛等症(浙江天目山药用植物志)。

本种最近粗壮唐松草 *T. robustum*, 但后者的茎、叶、花序均有短柔毛易于区别。

14. 疏序唐松草

Thalictrum laxum Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 9: 225. 1925.

茎高约 70 厘米, 无毛, 中部以上分枝。叶无毛, 茎上部叶为二回三出复叶; 顶生小叶有长小叶柄(长 2—4 厘米), 小叶片狭卵形或卵形, 长 5—8 厘米, 宽 3—5 厘米, 顶端微尖, 基部浅心形、圆形或近截形, 边缘每侧有 2—6 个常不等大的钝牙齿, 侧生小叶较小, 有短柄。花序圆锥状, 顶生或腋生, 长达 7.5 厘米, 不等二叉状分枝, 分枝有短柔毛; 苞片线形, 长 2—5 毫米; 花小, 萼片早落; 雄蕊多数, 花丝近丝形, 长 2—3 毫米, 花药线形, 长约 1 毫米; 心皮 6—8, 无柄, 长圆状卵形, 长约 2 毫米, 花柱长约 1 毫米, 拳卷。 3 月开花。

产湖北西部。

本种近巨齿唐松草 *T. grandidentatum*, 但小叶基部多为浅心形、花序分枝有柔毛, 花丝较细, 心皮数目较少可以区别。也近粗壮唐松草 *T. robustum*, 但茎和叶无毛, 小叶的牙齿顶端尖锐, 花丝较细。与大叶唐松草 *T. faberi* 的区别在于小叶的牙齿顶端钝, 花序分枝有柔毛, 花丝较细。

15. 粗壮唐松草(秦岭植物志) 图版 121: 7; 图版 129: 1—6

Thalictrum robustum Maxim. in Acta Hort. Petrop. 11: 18. 1890; 秦岭植物志 1 (2): 240. 1974. — *T. clematidifolium* Franch. in Morot, Journ. Bot. 8: 273. 1894. — *T. falcatum* Pamp. in Nouv. Giorn. Bot. Ital., n.