

月开花。

产我国台湾。在台湾自南部至北部的山地中广布。

狭丝唐松草 *T. micrandrum* Hayata 近本种,但花丝(棒形)较短、较细,长约1毫米,比花药窄。楔叶唐松草 *T. morii* Hayata 也近本种,但小叶楔状倒三角形,基部楔形。这二种也产我国台湾。

29b. 大花台湾唐松草(变种)

Thalictrum urbainii var. *majus* T. Shimizu in Journ. Fac. Tex. Sci. Technol., Shinshu Univ. n. 26, ser. A (Biol.), n. 10: 27, f. 4. 1961.

与台湾唐松草的区别:花较大,直径达3厘米。茎高20—40厘米。

产我国台湾。生海拔1600米一带山地。

30. 菲律宾唐松草 图版136: 1—2

Thalictrum philippinense C. B. Rob. in Bull. Torr. Bot. Club 35, 65. 1908; 海南植物志 1: 308. 1964.

植株全部无毛。茎高约18厘米,上部分枝。基生叶长约12厘米,有长柄,为三回三出复叶,叶片长约5厘米;小叶草质,有短柄,顶生小叶宽卵形、近圆形或宽倒卵形,长1—1.4厘米,宽1—1.6厘米,顶端圆形,基部圆形或浅心形,在中部之上三浅裂,浅裂片有圆齿,表面脉近平,腹面脉稍隆起,脉网明显;叶柄长约7厘米。茎生叶2,长1.7—2厘米,有短柄,为一回或二回三出复叶。复单歧聚伞花序顶生并腋生,有少数花;花梗长2—5毫米,结果时增长达12毫米;心皮约5,有短子房柄,花柱短。瘦果两侧扁,椭圆形,不包括柄长3.5毫米,宽约1.2毫米,两侧各具3条细纵肋,心皮柄长约2毫米,宿存花柱长0.8毫米。


在我国产广东海南岛五指山。生海拔1600米陡崖阴处。在菲律宾也有分布。

本种极近台湾唐松草 *T. urbainii*,但后者的小叶草质,可以区别。也极近阴地唐松草 *T. umbricola*,但花柱较长,拳卷,柱头较长,长约0.8毫米,线形,而阴地唐松草的花柱较短,稍弯曲,但不拳卷,柱头较短较小,长约0.5毫米,近扁球形。

31. 阴地唐松草 图版143: 7—9 (见568页)

Thalictrum umbricola Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 9: 221. 1925. — *T. gueguenii* Boivin in Rhodora 46: 366, f. 17. 1944.

植株全部无毛。茎高15—50厘米,纤细,分枝。基生叶长达30厘米,为二回或三回三出复叶;小叶薄草质,近圆形、圆菱形或宽倒卵形,长和宽为1—2.5厘米,基部圆形、浅心形或钝,三浅裂,裂片有1—2圆齿,脉平或在背面稍隆起,脉网不明显或稍



1—2. 菲律宾唐松草 *Thalictrum philippinense* 1. 植株全形; 2. 瘦果。3—6. 稀蕊唐松草 *T. oligandrum* 3. 结果的植株上部; 4. 花; 5. 雄蕊; 6. 瘦果。7—8. 花唐松草 *T. filamentosa* 7. 雄蕊; 8. 瘦果。(张泰利绘)