

毫米,宽 1.2—1.6 毫米,早落;雄蕊长约 4.5 毫米,花药狭长圆形,长 1.3—2 毫米,顶端钝,花丝狭线形或丝形;心皮 2—3 (—5),无柄,花柱短,柱头侧生。瘦果椭圆球形或稍两侧扁,长 3—3.5 毫米,有 8—9 条纵肋,宿存柱头长约 0.4 毫米。 6—7 月开花。

产云南西部和西北部、四川西南部。生海拔 2000—2500 米间山地灌丛中。模式标本采自云南鹤庆。

根可治小儿高热、惊风、肺炎等症(云南中草药)。

51. 多叶唐松草(中国药用植物志) 马尾黄连(云南、四川),马尾连、金丝黄连(四川西南) 图版 119, 120; 24; 图版 140: 4—8

*Thalictrum foliolosum* DC. Syst. 1: 175. 1818; Prodr. 1: 12. 1824; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 14. 1872; 四川中药志 2: 1480, 图 785. 1960; 中国药用植物志 7: 图 331. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 681, 图 1362. 1972.

植株全部无毛。茎高 90—200 厘米,上部有长分枝。茎中部以上叶为三回三出或近羽状复叶;叶片长达 36 厘米;小叶草质,顶生小叶菱状椭圆形或卵形,长 1—2.5 厘米,宽 0.5—1.5 厘米,顶端钝或圆形,基部浅心形或圆形,三浅裂,裂片有少数钝齿,脉平或背面稍隆起,脉网稍明显;叶柄长 1.5—5 厘米,有狭鞘。圆锥花序生茎或分枝顶端,有多数花,长约 20 厘米;萼片 4,淡黄绿色,早落,狭椭圆形,长 3—4.5 毫米;雄蕊多数,长 6—7 毫米,花药狭长圆形,长约 2.5 毫米,顶端有短尖头,花丝丝形;心皮 4—6,子房无柄,花柱与子房近等长,柱头生花柱腹面,线形。瘦果纺锤形,长约 3 毫米,有 8 条纵肋。 8—9 月开花。


在我国分布于云南、四川西南部(会理)、西藏南部(聂拉木)。生海拔 1500—3200 米间山地林中或草坡。在尼泊尔、锡金、印度北部也有分布。


根含小檗碱,可治肝炎、痢疾(云南中草药)、小儿热症、痘疹难透等症(四川中药志)。

本种稍近毛发唐松草 *T. trichopus*, 但花梗较短,花药有短尖头,柱头较长可以区别。

52. 细唐松草(北京植物志) 图版 140: 9—13

*Thalictrum tenue* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, sér. 2, 5, 168. 1883; Pl. David. 1: 16, pl. 7. 1884; 北京植物志,上册: 294. 1962; 中国高等植物图鉴 1: 682, 图 1364. 1972.





图版 119 雄蕊;图版 120 心皮。均放大 10 倍,在图版 121 中的图 5、6、9、12 和 13 的心皮的一部分放大 20 倍。1. 微毛爪哇唐松草 *T. javanicum* var. *puberum*; 2. 短毛唐松草 *T. brevisericum*; 3. 多枝唐松草 *T. ramosum*; 4. 长喙唐松草 *T. macrorhynchum*; 5. 峨嵋唐松草 *T. omeiense*; 6. 爪哇唐松草 *T. javanicum*; 7. 大叶唐松草 *T. faberi*; 8. 西南唐松草 *T. fargesii*; 9. 网脉唐松草 *T. reticulatum*; 10. 瓣蕊唐松草 *T. petaloideum*; 11. 尖叶唐松草 *T. acutifolium*; 12. 唐叶唐松草 *T. ichangense*; 13. 稀蕊唐松草 *T. oligandrum*; 14. 唐松草 *T. aquilegifolium* var. *sibiricum*; 15. 小果唐松草 *T. microgynum*; 16. 贝加尔唐松草 *T. baicalense* (在图版 121 中, 16a 是长柱贝加尔唐松草 *T. baicalense* var. *megalostigma*); 17. 小喙唐松草 *T. rostellatum*; 18. 钩柱唐松草 *T. uncatum*; 19. 白茎唐松草 *T. leuconotum*; 20. 芸香叶唐松草 *T. rutifolium*; 21. 帚枝唐松草 *T. virgatum*; 22. 丝叶唐松草 *T. foeniculaceum*; 23. 小叶唐松草 *T. elegans*; 24. 多叶唐松草 *T. foliolosum*; 25. 偏翅唐松草 *T. delavayi*; 26. 腺毛唐松草 *T. foetidum*; 27. 东亚唐松草 *T. minus* var. *hypoleucum*; 28. 高山唐松草 *T. alpinum*; 29. 鞭柱唐松草 *T. smithii*。(冯晋庸绘)



1—3.芸香叶唐松草 *Thalictrum rutifolium* 1. 果序; 2. 雄蕊; 3. 瘦果。4—8.多叶唐松草 *T. foliolosum* 4. 叶的一部分; 5. 部分花序; 6. 雄蕊; 7. 心皮群; 8. 瘦果。9—13. 细唐松草 *T. tenue* Franch. 9. 部分花序; 10. 结果的植株上部; 11 雄蕊; 12. 心皮群; 13. 瘦果×4。14—18. 鞭柱唐松草 *T. smithii* 14. 茎上部叶; 15. 部分花序; 16. 雄蕊; 17. 心皮群; 18. 瘦果。(蒋杏墙绘)