

米,宽约 1.8 毫米,外面有疏柔毛,脱落;雄蕊无毛,长约 7 毫米,花药狭长圆形,长约 2 毫米,顶端有短尖头,花丝丝形;心皮约 3,无柄,子房卵形,柱头狭三角形。7—8 月开花。

产陕西旬阳。生山地草坡。

本种外形与东亚唐松草 *T. minus* var. *hypoleucum* 相似,但茎、叶、花序均有柔毛,柱头无翅可以区别。

61. 亚欧唐松草

Thalictrum minus L. Sp. Pl. 546. 1753; Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. 24: 199, 293. 1885; Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 172. 1939.

植株全部无毛。茎下部叶有稍长柄或短柄,茎中部叶有短柄或近无柄,为四回三出羽状复叶;叶片长达 20 厘米;小叶纸质或薄革质,顶生小叶楔状倒卵形、宽倒卵形、近圆形或狭菱形,长 0.7—1.5 厘米,宽 0.4—1.3 厘米,基部楔形至圆形,三浅裂或有疏牙齿,偶而不裂,背面淡绿色,脉不明显隆起或只中脉稍隆起,脉网不明显;叶柄长达 4 厘米,基部有狭鞘。圆锥花序长达 30 厘米;花梗长 3—8 毫米;萼片 4,淡黄绿色,脱落,狭椭圆形,长约 3.5 毫米;雄蕊多数,长约 6 毫米,花药狭长圆形,长约 2 毫米,顶端有短尖头,花丝丝形;心皮 3—5,无柄,柱头正三角状箭头形。瘦果狭椭圆球形,稍扁,长约 3.5 毫米,有 8 条纵肋。6—7 月开花。

在我国分布于四川西部、青海、新疆、甘肃、山西。生海拔 1400—2700 米间山地草坡、田边、灌丛中或林中。在欧洲、亚洲等地广布。

在四川西北部民间药用。

61b. 长梗亚欧唐松草(变种)

Thalictrum minus var. *stipellatum* (C. A. Mey.) Tamura in Acta Phytotax. Geobot. 15: 87. 1953.——*T. kemense* Fries, Fl. Halland. 95. 1817; Hara in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo 3 (6): 56. 1952.——*T. kemense* var. *stipellatum* C. A. Mey. ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 16. 1859.——*T. minus* var. *kemense* (Fries) Trel. in Proc. Bot. Soc. Nat. Hist. 23: 300. 1888.

与亚欧唐松草的区别:花梗较长,长 15—30 毫米。小叶背面淡绿色,脉不明显隆起,脉网不明显。

在我国产新疆。生海拔 2500 米一带山地。在亚洲北部、欧洲北部也有分布。

61c. 东亚唐松草(变种) 烟锅草(陕西),金鸡脚下黄(贵州松桃),佛爷指甲、