

Anemone trullifolia var. **holophylla** Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 5: 263. 1912; Lauener, l. c. 23: 197. 1960.—*A. coelestina* f. *holophylla* (Diels) Comber, l. c. 18: 226. 1934.

与匙叶银莲花的区别：叶较狭，匙状倒披针形或匙形，长3.6—7.8厘米，宽0.8—2厘米，基部渐狭成柄，不分裂，在顶端有5—9圆或钝齿。萼片白色或黄色。

分布于云南西北部(丽江)、四川西南部(木里)。生海拔2500—3500米间山地草坡或沟边。模式标本采自云南丽江。

43. 微裂银莲花 图版9: 4—6

Anemone subindivisa W. T. Wang, 植物分类学报 12: 173. 1974.

植株高4—15厘米。根状茎垂直，长0.8—2厘米，粗0.5—1厘米。基生叶约5，有长柄；叶片宽卵形或圆卵形，长1.7—3.8厘米，宽1.4—3.2厘米，顶端圆形，基部圆形或截状圆形，不分裂或不明显三浅裂，边缘在中部或基部之上有钝牙齿，两面密被长柔毛；苞片3，无柄，近等大，卵形或倒卵形，长0.8—1.1厘米，顶端钝，有3齿或全缘，密被长柔毛；花梗1，长0.4—1.2厘米；萼片5，白色，宽椭圆形，长0.8—1.1厘米，宽5—8毫米，顶端圆形或钝，外面有柔毛；雄蕊长2.5—5毫米，花药长约1毫米；心皮10—22，子房有短柔毛。5月至7月开花。

分布于云南西北部(洱源)、四川西南部(木里)。生海拔2900—3700米间山地草坡、冷杉林下或松栎林下。模式标本采自四川木里。

组7. 银莲花组——Sect. *Omalocarpus* DC. Syst. 1: 212. 1818.

与钝裂银莲花组极为相近，但花序为简单或复杂的伞形花序，稀只有1花；心皮通常无毛；瘦果强烈两侧扁，沿背缝线和腹缝线有边缘。

约10余种，分布于亚洲、欧洲和北美洲。我国有9种，分布于西南、西北和华北。

44. 伏毛银莲花(变种)

Anemone narcissiflora L. var. **protracta** Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 266. 1906.—*A. protracta* (Ulbr.) Juz. in Fl. URSS 7: 273. 1937.

植株高29—37厘米。根状茎长约6厘米。基生叶7—9，有长柄；叶片圆卵形或近圆形，长3.7—4.6厘米，宽5—6.8厘米，基部心形，三全裂，中全裂片有柄(长3—8毫米)或近无柄，菱状倒卵形或扇状倒卵形，三裂至中部或超过中部，末回裂片卵形或披针形，侧全裂片斜扇形，不等二或三深裂，表面近无毛，背面密被紧贴的长柔毛，边缘有密睫毛；叶柄长10—20厘米，有贴生或近贴生的长柔毛。花葶直立，有与叶柄相同的柔毛；苞片约4，无柄，菱形或宽菱形，三深裂，或倒披针形，不分裂，顶端有3齿；伞辐2—5，长1—7厘米，有柔毛；萼片5(—6—7)，白色，倒卵形，长1.2—1.5厘米，宽6—10毫米，外面有短柔毛；雄蕊长2—4毫米，花药椭圆形；心皮无毛。6月至7月开花。

在我国产新疆西部(昭苏)。生海拔1850—2700米间山地草坡或云杉林中。在苏联中亚地区也有分布。

44b. 长毛银莲花(变种) 图版13: 8

Anemone narcissiflora var. **crinita** (Juz.) Tamura in Act. Phytotax. Geobot. 17: 115. 1958; 东北草本植物志3: 158. 1975.—*A. crinita* Juz. in Fl. URSS 7: 274. 1937.—*A. narcissiflora* ssp. *crinita* (Juz.) Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 213. 1939.

与伏毛银莲花的区别: 叶片近圆形或圆五角形, 较大, 长4—6厘米, 宽7.5—11厘米, 全裂片无柄, 细裂, 末回裂片披针形至线形; 花萼和叶柄密被近平展或稍向下斜展的长柔毛。植株高45—67厘米。

在我国分布于河北北部、辽宁西部、黑龙江西部。生山地草坡或林下。在蒙古、苏联西伯利亚地区也有分布。

44c. 天山银莲花(变种) 图版13: 1—3

Anemone narcissiflora var. **turkestanica** Schipcz. in Act. Hort. Bot. Univ. Jurjev. 13: 101. 1912.—*A. schrenkiana* Juz. in Fl. URSS 7: 273. 1937.

与伏毛银莲花的区别: 叶的全裂片无柄, 叶柄和花萼都密被向下斜展的长柔毛。叶片圆肾形, 长4—6厘米, 宽5—7.5厘米, 末回裂片宽披针形或狭卵形。萼片5。

在我国产新疆西部。生山地草坡。在苏联中亚地区也有分布。

44d. 卵裂银莲花(变种)

Anemone narcissiflora var. **sibirica** (L.) Tamura in Act. Phytotax. Geobot. 17: 115. 1958.—*A. sibirica* L. Sp. pl. 541. 1753; DC. Prodr. 1: 22. 1824.


与伏毛银莲花的区别: 叶的全裂片无柄, 分裂程度较小, 末回裂片卵形或狭卵形; 叶柄和花萼都有向下斜展的白色长柔毛。叶片心状宽卵形, 长3—5厘米, 宽5—7厘米。萼片5, 白色。

在我国分布于新疆东部、内蒙古西部、宁夏(贺兰山)。生海拔2300—3000米间山地草坡或灌丛中。在蒙古、苏联西伯利亚地区也有分布。

45. 展毛银莲花 垂枝莲(四川西北) 图版14: 4—6

Anemone demissa Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 23. 1855; in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 9. 1872; Brühl in Ann. Bot. Gard. Calc. 5: 81, t. 107. 1896; Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 267. 1906.—*A. demissa* var. *umbellata* Brühl, l. c. 81.—*A. narcissiflora* var. *demissa* (Hook. f. et Thoms.) Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 73. 1904, p. p.

植株高(10—)20—45厘米。基生叶5—13, 有长柄; 叶片卵形, 长3—4厘米, 宽



1—3. 疏齿银莲花 *Anemone obtusiloba* ssp. *ovalifolia* 1. 植株; 2. 雄蕊; 3. 心皮。4—6.
微裂银莲花 *A. subindivisa* 4. 基生叶; 5. 雄蕊; 6. 心皮。7—9. 近羽裂银莲花 *A. subpinnata*
7. 植株; 8. 雄蕊; 9. 心皮。10—13. 维西银莲花 *A. obtusiloba* ssp. *ovalifolia* var. *polysepala*
10. 基生叶; 11. 花萼; 12. 雄蕊; 13. 心皮。(赵宝恒绘)