

在我国产新疆西部(昭苏)。生海拔1850—2700米间山地草坡或云杉林中。在苏联中亚地区也有分布。

44b. 长毛银莲花(变种) 图版13: 8

Anemone narcissiflora var. **crinita** (Juz.) Tamura in Act. Phytotax. Geobot. 17: 115. 1958; 东北草本植物志3: 158. 1975.—*A. crinita* Juz. in Fl. URSS 7: 274. 1937.—*A. narcissiflora* ssp. *crinita* (Juz.) Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 213. 1939.

与伏毛银莲花的区别: 叶片近圆形或圆五角形, 较大, 长4—6厘米, 宽7.5—11厘米, 全裂片无柄, 细裂, 末回裂片披针形至线形; 花萼和叶柄密被近平展或稍向下斜展的长柔毛。植株高45—67厘米。

在我国分布于河北北部、辽宁西部、黑龙江西部。生山地草坡或林下。在蒙古、苏联西伯利亚地区也有分布。

44c. 天山银莲花(变种) 图版13: 1—3

Anemone narcissiflora var. **turkestanica** Schipcz. in Act. Hort. Bot. Univ. Jurjev. 13: 101. 1912.—*A. schrenkiana* Juz. in Fl. URSS 7: 273. 1937.

与伏毛银莲花的区别: 叶的全裂片无柄, 叶柄和花萼都密被向下斜展的长柔毛。叶片圆肾形, 长4—6厘米, 宽5—7.5厘米, 末回裂片宽披针形或狭卵形。萼片5。

在我国产新疆西部。生山地草坡。在苏联中亚地区也有分布。

44d. 卵裂银莲花(变种)

Anemone narcissiflora var. **sibirica** (L.) Tamura in Act. Phytotax. Geobot. 17: 115. 1958.—*A. sibirica* L. Sp. pl. 541. 1753; DC. Prodr. 1: 22. 1824.


与伏毛银莲花的区别: 叶的全裂片无柄, 分裂程度较小, 末回裂片卵形或狭卵形; 叶柄和花萼都有向下斜展的白色长柔毛。叶片心状宽卵形, 长3—5厘米, 宽5—7厘米。萼片5, 白色。

在我国分布于新疆东部、内蒙古西部、宁夏(贺兰山)。生海拔2300—3000米间山地草坡或灌丛中。在蒙古、苏联西伯利亚地区也有分布。

45. 展毛银莲花 垂枝莲(四川西北) 图版14: 4—6

Anemone demissa Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 23. 1855; in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 9. 1872; Brühl in Ann. Bot. Gard. Calc. 5: 81, t. 107. 1896; Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 267. 1906.—*A. demissa* var. *umbellata* Brühl, l. c. 81.—*A. narcissiflora* var. *demissa* (Hook. f. et Thoms.) Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 73. 1904, p. p.

植株高(10—)20—45厘米。基生叶5—13, 有长柄; 叶片卵形, 长3—4厘米, 宽



1—3. 透裂银莲花 *Anemone imbricata* 1.植株外形; 2.雄蕊; 3.瘦果。4—6.展毛银莲花 *A. demissa* 4.植株外形; 5.雄蕊; 6.瘦果。7—9. 山东银莲花 *A. chosenicola* var. *schantungensis* 7.花序; 8.基生叶; 9. 雄蕊。(王金凤绘)

3.2—4.5 厘米，基部心形，三全裂，中全裂片菱状宽卵形，基部宽楔形，突缩成短柄(长3—5毫米)，三深裂，深裂片浅裂，末回裂片卵形，顶端急尖，侧全裂片较小，近无柄，卵形，不等三深裂，各回裂片互相多少覆盖，表面变无毛，背面有稍密的长柔毛；叶柄长9—15厘米，与花萼都有开展的长柔毛(毛长2.5—4.5毫米)，基部有狭鞘。花萼1—2(—3)；苞片3，无柄，长1.2—2.4厘米，三深裂，裂片线形，有长柔毛；伞辐1—5，长1.5—8.5厘米，有柔毛；萼片5—6，蓝色或紫色，偶尔白色，倒卵形或椭圆状倒卵形，长1—1.8厘米，宽0.5—1.2厘米，外面有疏柔毛；雄蕊长2.5—5毫米；心皮无毛。瘦果扁平，椭圆形或倒卵形，长5.5—7毫米，宽约5毫米。6月至7月开花。

在我国分布于四川西部、甘肃西南部、青海东南部和南部、西藏东部和南部。生海拔3200—4600米间山地草坡或疏林中。在不丹、锡金、尼泊尔也有分布。

在四川西北部，用展毛银莲花的瘦果治牲畜疥癣。

45b. 云南银莲花(变种) 图版 15: 1—2

Anemone demissa var. *yunnanensis* Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33: 367. 1886; pl. Delav. 10. 1889.—? *A. bicolor* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 24: 42. 1915.

与展毛银莲花的区别：叶的全裂片和末回裂片均互相分开，末回裂片顶端钝或圆形；萼片5—8，白色。

分布于云南北部和西北部、四川西南部。生海拔3200—4000米间山地草坡或林下。模式标本采自云南大理。

45c. 宽叶展毛银莲花(变种) 图版 13: 4—7

Anemone demissa var. *major* W. T. Wang in Addenda.

与展毛银莲花的区别：叶较大，叶片心状圆形或心状圆卵形，长4—6.5厘米，宽6—10厘米(中全裂片通常有短柄，或近无柄，末回裂片较短而宽，狭卵形、卵形或三角形；叶柄和花萼都有开展或近开展的长柔毛)。萼片5(—6)，白色或蓝紫色。植株高25—68厘米。

分布于云南西北部、四川西部、西藏南部。生海拔3200—4100米间山地草坡或疏林下。

45d. 密毛银莲花(变种)

Anemone demissa var. *vilosissima* Brühl in Ann. Bot. Gard. Calc. 5: 81. 1896; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 180. 1939.—*A. demissa* var. *villosa* Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 267. 1906.

与展毛银莲花的区别：叶片肾状五角形，背面有密柔毛；花萼和叶柄有极密的、开展的淡褐色长柔毛。萼片白色。

在我国分布于甘肃南部(临潭、舟曲)、四川西部、云南西北部(大理以北)、西藏南部。