

披针形,全缘或有3齿,有短柔毛;伞幅1—5,长3—6厘米;萼片5,白色,倒卵形,长0.7—1厘米,宽5—6毫米,顶端圆形,外面疏被短柔毛;雄蕊长2.5—5毫米,花药长椭圆形,长约0.7毫米;心皮10—15,无毛。瘦果扁平,圆卵形或宽卵形,长6—7.5毫米,宽2.5—3毫米,无毛,宿存花柱向下弯曲,长1—1.5毫米。7月开花。

产陕西秦岭。生海拔2900—3700米间山地草坡或多石砾处。

《秦岭植物志》第一卷,第二册,图245是太白银莲花的图,可以参考。

本种接近展毛银莲花 *A. demissa*,但花萼和叶柄都有短柔毛,萼片白色,可以区别。

49. 银莲花(河北) 图版15: 5—9

Anemone cathayensis Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 213. 1939; Tamura in Act. Phytotax. Geobot. 17: 114. 1958; 中国高等植物图鉴 1: 730, 图1460. 1972.—*A. demissa* var. *glabrescens* Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 267. 1906.—*A. narcissiflora* var. *pekinensis* Schipcz. in Act. Hort. Bot. Univ. Jurejew. 13: 85. 1912.—*A. narcissiflora* var. *chinensis* Kitag. in Rep 1st Sci. Exp. Manch. 4 (4): 17. 1935; 东北植物志 3: 158. 1975.—*A. narcissiflora* ssp. *chinensis* (Kitag.) Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 213. 1939; 东北植物检索表 74. 1959.

植株高15—40厘米。根状茎长4—6厘米。基生叶4—8,有长柄;叶片圆肾形,偶尔圆卵形,长2—5.5厘米,宽4—9厘米,三全裂,全裂片稍覆盖,中全裂片有短柄或无柄,宽菱形或菱状倒卵形,三裂近中部,二回裂片浅裂,末回裂片卵形或狭卵形,侧全裂片斜扇形,不等三深裂,两面散生柔毛或变无毛;叶柄长6—30厘米,除基部有较密长柔毛外,其他部分有稀疏长柔毛或无毛。花萼2—6,有疏柔毛或无毛;苞片约5,无柄,不等大,菱形或倒卵形,三浅裂或三深裂;伞幅2—5,长2—5厘米,有疏柔毛或无毛;萼片5—6(—8—10),白色或带粉红色,倒卵形或狭倒卵形,长1—1.8厘米,宽5—11毫米,顶端圆形或钝,无毛;雄蕊长约5毫米,花药狭椭圆形;心皮4—16,无毛。瘦果扁平,宽椭圆形或近圆形,长约5毫米,宽4—5毫米。4月至7月开花。

在我国分布于山西、河北。生海拔1000—2600米间山坡草地、山谷沟边或多石砾坡地。在朝鲜也有分布。模式标本采自河北密云。


49b. 毛蕊银莲花(变种) 图版15: 10

Anemone cathayensis var. *hispida* Tamura in Act. Phytotax. Geobot. 17: 114. 1958.

与银莲花的区别:子房有毛。

在我国分布于河南西北部(林县)、河北北部。生海拔1000—2800米间山地草坡。在朝鲜也有分布。模式标本采自河北北部。

50. 叠裂银莲花(中国高等植物图鉴) 图版14: 1—3



1—2. 云南银莲花 *Anemone demissa* var. *yunnanensis* 1. 基生叶; 2. 聚合果。3—4. 太白银莲花 *A. taipaiensis* 3. 基生叶; 4. 瘦果。5—9. 银莲花 *A. cathayensis* 5. 植株全形; 6. 雄蕊; 7. 心皮; 8. 聚合果; 9. 瘦果。10. 毛蕊银莲花 *A. cathayensis* var. *hispida* 10. 心皮。
(赵宝恒, 张泰利绘)