

## 63. 陕西铁线莲(秦岭植物志) 武当铁线莲(湖北植物志)

*Clematis shensiensis* W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 378, 图版 59, 图 6. 1957; 秦岭植物志 1(2): 295, 图 252. 1974. — *C. wutangensis* W. T. Wang, 湖北植物志 1: 369. 1976, nom. seminud.

藤本。小茎枝圆柱形,有纵条纹和短柔毛。一回羽复叶,常有5小叶;小叶片纸质,卵形或宽卵形,长2.5—7厘米,宽1.5—5.5厘米,顶端锐尖、短渐尖或钝,基部浅心形或圆形,全缘,上面疏生短柔毛或近无毛,下面密生短柔毛,两面网脉常不明显突出。聚伞花序腋生或顶生,3—9花或花单生,常稍比叶短;花序梗、花梗密生短柔毛;花直径3—5厘米;萼片4,或5—6,开展,白色,倒披针形至倒卵状长圆形,长1—2.5厘米,宽约5毫米,外面边缘密生绒毛,中间为短柔毛;雄蕊无毛。瘦果卵形,扁,长5—8毫米,宽3—5毫米,宿存花柱长达4厘米,有金黄色长柔毛。花期5月至6月,果期8月至9月。

分布于陕西南部(海拔1200米左右)、湖北西部、河南南部、山西南部。生山坡灌丛中、山沟边或石壁上。模式标本采自陕西终南山。

## 64. 五叶铁线莲 柳叶见血飞、辣药(云南药用植物名录) 图版 51

*Clematis quinquefoliolata* Hutch. in Gard. Chron. ser. 3, 41: 3. 1907; Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 328. 1913; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 208. 1939.

木质藤本。茎、枝有纵条纹,小枝有短柔毛,后变无毛。一回羽状复叶,有5小叶;小叶片薄革质,长圆状披针形、卵状披针形至长卵形或卵形,长4—9厘米,宽1—3.5厘米,顶端凸尖至渐尖,基部圆形至浅心形,或为楔形,全缘,两面无毛,或下面稍有柔毛。聚伞花序或总状、圆锥状聚伞花序,腋生或顶生,有3—10余朵花;花序梗、花梗疏生短柔毛;萼片4,开展,白色,近长圆形或倒卵状椭圆形,长1—2厘米,外面有短柔毛,边缘密生绒毛,内面无毛。瘦果卵形或椭圆形,扁,长约5毫米,有柔毛,宿存花柱长达6厘米。花期6月至8月,果期7月至10月。

分布于云南嵩明(1880米)、四川、贵州、湖北西部(1000—1600米)、湖南。生山坡、路旁灌丛中或水沟边。模式标本采自湖北。

根药用能祛风除湿、温中理气、散瘀止痛,治腹痛吐泻、虚寒胃痛、月经不调、痛经、干血癆、风湿麻木、关节疼痛、跌打损伤、偏头痛、神经痛等(云南药用植物名录)。

采自云南嵩明的No. 51338二分标本(存中国科学院昆明植物研究所),除小叶片顶端渐尖、基本楔形外,其余特征与湖北、四川的标本基本相似,因标本少,故仍作同一种处理。

## 65. 毛柱铁线莲(中国高等植物图鉴) 吹风藤、老虎须藤(广西上思) 图 22

*Clematis meyeniana* Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. Misc. 19 (suppl. 1): 297. 1843; Benth. Fl. Hongk. 6. 1861; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb.

22; 220. 1876; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23; 5. 1886; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33; 360. 1886; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50; 530. 1903; Lévl. Fl. Kouy-Tcheou 333. 1915; Sprag. in Kew Bull. 1916; 46. 1916; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13; 207. 1939; Péi in Sunyatsenia 4; 163. 1940; 中国高等植物图鉴 1: 747, 图 1494. 1972; 台湾植物志 2: 486. 1976.——*C. oreophila* Hance in Walp. Ann. 2; 3. 1851.——*C. meyeniana* f. *major* et f. *retusa* Sprag. in Kew Bull. 1916; 46. 1916; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13; 207. 1939.

木质藤本。老枝圆柱形,有纵条纹,小枝有棱。三出复叶;小叶片近革质,卵形或卵状长圆形,有时为宽卵形,长3—9(—12)厘米,宽2—5(—7.5)厘米,顶端锐尖、渐尖或钝急尖,基部圆形、浅心形或宽楔形,全缘,两面无毛。圆锥状聚伞花序多花,腋生或顶生,常比叶长或近等长;通常无宿存芽鳞,偶尔有;苞片小,钻形;萼片4,开展,白色,长椭圆形或披针形,顶端钝、凸尖有时微凹,长0.7—1.2厘米,外面边缘有绒毛,内面无毛;雄蕊无毛。瘦果镰刀状狭卵形或狭倒卵形,长约4.5毫米,有柔毛,宿存花柱长达2.5厘米。花期6月至8月,果期8月至10月。

在我国分布于云南(海拔1100—1850米)、四川、贵州南部(海拔700—1250米)、广西(480—1400米)、广东(250—1000米)、湖南南部(300—1200米)、福建、台湾、江西(600—1300米)、浙江龙泉。生山坡疏林及路旁灌丛中或山谷、溪边。老挝、越南、日本也有分布。模式标本采自香港。

全株能破血通经、活络止痛,治风寒感冒、胃痛、闭经、跌打瘀肿、风湿麻木、腰痛(云南药用植物名录)。茎皮纤维供造纸、搓绳等的原料。

65b. 沙叶铁线莲(中国高等植物图鉴)(变种)

*Clematis meyeniana* var. *granulata* Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 50; 530. 1903; Sprag. in Kew Bull. 1916; 46. 1916; Chun in Sunyatsenia 1; 230. 1934; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13; 207. 1939; 海南植物志 1: 307. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 747. 1972.——*C. granulata* (Finet et Gagnep.) Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. 6; 147. 1937.




图 22: 毛柱铁线莲 *Clematis meyeniana*

1. 部分茎示花序和叶; 2. 萼片(外面);  
3. 雄蕊; 4. 心皮。(王兴国绘)