

山坡、山谷、溪边、沟旁灌丛中或疏林中。模式标本采自云南丽江。

84. 两广铁线莲(中国高等植物图鉴) 图版 60

Clematis chingii W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 383, 图版 59, 图 7. 1957; 中国高等植物图鉴 1: 752. 1972.

灌木状藤本。小枝、叶柄及花序梗均密生淡黄褐色短柔毛。一回羽状复叶, 有 5 小叶, 有时为三出叶; 小叶片卵形或宽卵形, 长 5.5—10 厘米, 宽 4—6.5 厘米, 顶端锐尖或渐尖, 基部通常为心形或圆形, 边缘疏生缺刻状牙齿或不明显, 牙齿三角状卵形, 不等, 顶端锐尖或有尖头, 有时在中部以上 3 浅裂, 上面密生刚伏毛, 下面密生短柔毛。圆锥状聚伞花序多花, 腋生, 通常比叶长或近等长; 花梗细, 密生短柔毛; 花直径约 1.5 厘米; 萼片 4, 开展, 白色, 长卵形或倒卵状长圆形, 外面有淡黄色短绒毛, 内面无毛; 雄蕊无毛, 花丝比花药长 5 倍。瘦果卵形, 稍扁, 有柔毛, 宿存花柱长约 4 厘米。花期 7 月至 9 月, 果期 10 月至 12 月。

分布于云南南部(海拔 1400—1700 米)、贵州西南部(600—1400 米)、广西(200—1400 米)、广东。生山坡灌丛中。模式标本采自广西百色。

85. 福贡铁线莲 图版 61

Clematis tsaii W. T. Wang, 植物分类学报 6(1): 382. 1957.


灌木状藤本。茎密生褐色贴伏的短柔毛。一回羽状复叶, 有 5 小叶, 有时为三出叶; 小叶片纸质, 椭圆状卵形或椭圆状长圆形, 偶尔斜菱形, 长 7—13.5 厘米, 宽 3.5—7 厘米, 顶端渐尖, 基部宽楔形至近心形, 全缘, 上面有稀疏刚伏毛, 下面密生短柔毛。圆锥状聚伞花序多花, 腋生或顶生, 较叶短; 花序梗及花梗有短柔毛; 花直径约 2 厘米; 花梗纤细; 萼片 4, 开展, 白色, 倒卵状长圆形或倒披针形, 长 0.8—1 厘米, 外面有短柔毛, 内面无毛; 雄蕊无毛, 花丝比花药长 4—5 倍。幼嫩瘦果扁, 卵形, 有褐色柔毛, 宿存花柱长达 3.5 厘米。花期 7 月至 9 月, 果期 10 月至 12 月。

分布于云南福贡、景东、文山。生海拔 1500—2000 米间的山坡、路旁灌丛中或混交林中。模式标本采自云南福贡。

此外, 根据文献记载, 本亚组尚有三种, *C. bartlettii* Yamamoto in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 20: 101. 1930, *C. sasakii* Shimizu in Taiwania 18(2): 173. 1973 及 *C. formosana* Kuntze in Hooker's Ic. pl. 1945. 1891, 三者均为三出复叶, 产我国台湾, 因未见标本, 留待考证。

组 6. 铁线莲组——Sect. *Viticella* DC. Syst. 1: 160. 1818; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 198. 1939.

木质藤本。单叶、羽状复叶至二回三出复叶, 小叶片全缘或有时分裂。花大, 1—3 朵顶生或腋生, 花梗常有 1 对叶状苞片。萼片开展, 4—8 枚, 有宽边。雄蕊无毛, 无退化雄



小囊衣藤 *Clematis gouriana*
1. 部分茎示果序和叶; 2. 瘦果。(史渭清绘)