

2. 三出复叶；侧小叶两侧不对称；花有6枚蜜腺状花瓣；果较小，卵形，长2厘米以下。
 3. 小叶纸质（开花时膜质）；心皮3，每心皮具胚珠多数；浆果成串悬垂；种子多数……………
 ……………… 6. 串果藤属 *Sinofranchetia* (Diels) Hemsl.
 3. 小叶革质；心皮多数，螺旋状排列，每心皮具1胚珠；浆果具柄，多个着生于一球形花托上；
 种子单生…………… 7. 大血藤属* *Sargentodoxa* Rehd. et Wils.

1. 猫儿屎属 *Decaisnea* Hook. f. et Thoms.

Hook. f. et Thoms. in Proc. Linn. Soc. London **2** : 350. 1854;
 Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **1** : 4. 1862; Spongberg in Journ. Arn.
 Arb. **60** : 307. 1979.

落叶灌木。分枝少；冬芽大，卵形，有外鳞片2枚。奇数羽状复叶，无托叶；叶柄基部具关节；小叶对生，全缘，具短的小叶柄。花杂性，组成总状花序或再复合为顶生的圆锥花序；萼片6，花瓣状，2轮，近覆瓦状排列，披针形，先端长尾状渐尖；花瓣不存在。雄花：雄蕊6枚，合生为单体，花药长圆形，两缝开裂，先端具药隔伸出所成之附属体；退化心皮小，通常藏于花丝管内。雌花：退化雄蕊6枚，离生或基部合生；心皮3，离生，直立，无花柱，柱头倒卵状长圆形，胚珠多数，2行排列于心皮腹缝线两侧，胚珠间无毛状体。肉质蓇葖果圆柱形，最后沿腹缝开裂；种子多数，藏于白色果肉中，倒卵形或长圆形，压扁，外种皮骨质，黑色或深褐色。

1种，分布于我国西南部和中部；东喜马拉雅山脉地区的尼泊尔、不丹、锡金、印度东北部和缅甸北部也有分布。

1. 猫儿屎 矮杞树；猫儿子（湖北）；猫屎瓜（秦岭） 图版1

Decaisnea insignis (Griff.) Hook. f. et Thoms. in Proc. Linn. Soc. London **2** : 349. 1855; H. N. Qin in Cathaya **8—9** : 41. 1997. — *Slackia insignis* Griff., Itin. Pl. Proc. Linn. Soc. London, **2** : 350. 1855. — *D. fargesii* Franch. in Morot Journ. de Bot. **6** : 234. 1892; Diels in Bot. Jahrb. **29** : 342. 1900; Hook. f. in Bot. Mag. **128** : t. 7848. 1902; Rehd. & Wils. in Sargent, Pl. Wils. **1** : 344. 1913; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **5** : 137. 1924; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7** : 262. 1931; 秦岭植物志 **1** (2) : 301. 1974; 湖北植物志 **1** : 375. 1976; 云南植物志 **2** : 12. 1979; 中国高等植物图鉴 **1** : 754. 1980; 安徽植物志 **2** : 354. 1986; 贵州植物志 **2** : 139. 1986; 四川植物志 **8** : 107. 1989; 浙江植物志 **2** : 306. 1992.

直立灌木，高5米。茎有圆形或椭圆形的皮孔；枝粗而脆，易断，渐变黄色，有粗大的髓部；冬芽卵形，顶端尖，鳞片外面密布小疣凸。羽状复叶长50—80厘米，有小

* 本卷三校时发现木通科漏了大血藤属，现置于第305页。（校者注）