

4. 小叶线状长圆形、线状披针形或线形，宽1厘米以上，长为宽的4—5倍 6. 五脉藤 *H. fargesii* Reaub.

4. 小叶狭线形，宽3—6毫米，长为宽的7—14倍 ... 10. 线叶八月瓜 *H. linearifolia* T. Chen
2. 茎和枝具棱或具狭翅。

3. 小叶侧脉在上面明显凹入；花较小，雄花长约8毫米 11. 沙坝八月瓜 *H. chapaensis* Gagnep.

3. 小叶侧脉在两面均凸起或在上面平坦，但决不凹入；雄花长12毫米以上 12. 棱茎八月瓜 *H. pterocaulis* T. Chen et C. H. Chen

1. 鹰爪枫（中国树木分类学） 三月藤（广西），牵藤（四川），破骨风（湖北），八月枰（经济植物手册）

Holboellia coriacea Diels in Bot. Jahrb. **29**: 342. 1900; Reaub. in Bull. Soc. Bot. France **53**: 453. 1906; Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils **1**: 345. 1913; Beckett in Gard. Chron. III. **77**: 389. t. 75. 1925; Chien in Contr. Lab. Biol. Sci. Soc. China **9**: 272. 1931; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **10**: 189. 1936; 陈嵘，中国树木分类学 268. 1937; 秦岭植物志 **1** (2): 305. 1974; 湖北植物志 **1**: 377. 1976; 中国高等植物图鉴 **1**: 755. 1980; 贵州植物志 **2**: 143. 1986; 安徽植物志 **2**: 356. 1986; 四川植物志 **8**: 113. 1989; 浙江植物志 **2**: 302. 1992; H. N. Qin in Cathaya **8—9**: 103. 1997. —*Stauntonia brevipes* Hemsl. in Hook. Icon. Pl. ser. 4, **9**: t. 2849. 1907. —*Holboellia coriacea* Diels var. *brevipes* (Hemsl.) Chun in sched. —*H. brevipes* (Hemsl.) P. C. Kuo in Fl. Tsinling. **1**: 304. 1974. —*Artabotrys esquirolii* Lévl. Fl. Kouy-Tcheou. **29**. 1914. —*H. coriacea* Diels var. *angustifolia* Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. **17**: 273. 1910.

常绿木质藤本。茎皮褐色。掌状复叶有小叶3片；叶柄长3.5—10厘米；小叶厚革质，椭圆形或卵状椭圆形，较少为披针形或长圆形，顶小叶有时倒卵形，长(2)6—10(15)厘米，宽(1)4—5(8)厘米，先端渐尖或微凹而有小尖头，基部圆或楔形，边缘略背卷，上面深绿色，有光泽，下面粉绿色；中脉在上面凹入，下面凸起，基部三出脉，侧脉每边4条，与网脉在嫩叶时两面凸起，叶成长时脉在上面稍下陷或两面不明显；小叶柄长5—30毫米。花雌雄同株，白绿色或紫色，组成短的伞房式总状花序；总花梗短或近于无梗，数至多个簇生于叶腋。雄花：花梗长约2厘米；萼片长圆形，长约1厘米，宽约4毫米；顶端钝，内轮的较狭；花瓣极小，近圆形，直径不及1毫米；雄蕊长6—7.5毫米，药隔突出于药室之上成极短的凸头，退化心皮锥尖，长约1.5毫米。雌花：花梗稍粗，长3.5—5厘米；萼片紫色，与雄花的近似但稍大，外轮的长约12毫米，宽7—8毫米；退化雄蕊极小，无花丝；心皮卵状棒形，长约9毫米。果长圆状柱形，长5—6厘米；直径约3厘米，熟时紫色，干后黑色，外面密布小疣点；种子椭圆

形，略扁平，长约8毫米，宽5—6毫米，种皮黑色，有光泽。花期4—5月，果期6—8月。

产于四川、陕西、湖北、贵州、湖南、江西、安徽、江苏和浙江。生于海拔500—2000米的山地杂木林或路旁灌丛中。

果可食，亦可酿酒；根和茎皮药用，治关节炎及风湿痹痛。

2. 小花鹰爪枫 图版3:9—12

Holboellia parviflora (Hemsl.) Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris **14**: 68. 1908; H. N. Qin in Cathaya **8—9**: 100. 1997, excl. syn. *H. latistaminea* T. Chen. ——*Stauntonia parviflora* Hemsl. in Hook. Icon. Pl. ser. 4, **29**: t. 2849. 1907.

常绿木质藤本，全株无毛。枝有细线纹。叶具羽状3小叶；叶柄纤细，圆柱状，长4—8厘米；小叶薄革质，披针形、长圆状披针形或卵形，长7—11厘米，宽3—5厘米，先端渐尖或长渐尖，基部阔楔形或圆形而中间折叠，上面有光泽，下面淡绿色，干时淡褐色；中脉在上面凹陷，下面凸起，侧脉每边5—6条，与网脉同于两面略凸起，在下面尤明显；小叶柄长5—25毫米。花小，绿色，雌雄同株。雄花：多朵组成具短梗的伞房花序，花序长1.5—2厘米，簇生于叶腋；总花梗长4毫米，基部为扁圆形的芽鳞片所包；花梗纤细，长5—10毫米；外轮萼片厚，近肉质，广卵形，凹面，长4—5毫米，顶端较厚，急尖，内轮3片较薄，披针形，长约3毫米；花瓣极小，椭圆形，长不及1毫米；雄蕊长3.5—4毫米，不等长，3枚和内轮萼片对生的与外轮萼片等长，其余3枚较短，花丝稍粗，三棱柱形，基部楔尖，药隔完全不突出于药室之上，退化心皮与花瓣近等长。雌花：数朵组成短的伞房花序；总花梗长约5毫米，与雄花序同簇生于叶腋；花梗比雄花的稍粗，长8—10毫米，外轮萼片卵形，长约7毫米，宽约4毫米，顶端急尖，内轮的较狭且较短；退化雄蕊很小；心皮圆锥状，长约4毫米，柱头偏斜，具罅隙。果椭圆形，长2.5—6厘米，直径2—3厘米，不开裂。花期11—12月，果期翌年9—10月。

产于云南东南部、贵州、广西和湖南。生于海拔1800—1900米的山坡林中、林缘或沟谷旁。

3. 扁丝八月瓜 图版3: 1—8

Holboellia latistaminea T. Chen [Icon. Corm. Sin. Suppl. **1**: 484. 1982. in clavi nom nud.] sp. nov. in Addenda p. 307.

木质藤本。全株无毛；茎圆柱形，干时灰褐色或近黑色，有线纹；芽鳞片近圆形。叶具羽状3小叶；叶柄圆柱形，长5—6厘米；小叶革质，长圆形或卵状长圆形，长9—14厘米，宽5—6.5厘米，先端钝而具凸头或短渐尖，基部阔圆至近截平，两端常纵折叠，干时上面深灰褐色，下面赤褐色，具乳凸；中脉在上面凹入，下面凸起，侧脉