

8b. 狭叶八月瓜 (变种)

var. **angustifolia** Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 108. 1872. — *H. angustifolia* Wall. Tent. Fl. Nepal. 24: t. 17. 1824; Decne. l. c. — *Stauntonis angustifolia* Wall. Cat. 4951. 1830, nom. nud.

小叶 7—9 片，狭披针形或线状披针形。

产于云南西部。生于海拔 2500 米的山地林中。

9. 墨脱八月瓜

Holboellia medogensis H. N. Qin in Cathaya 8—9: 93. 1997.

落叶木质藤本。茎皮灰暗，有椭圆形的皮孔。掌状复叶有小叶 5—6 片；叶柄长 15—19 厘米；小叶纸质，椭圆形，长 8—11 厘米，宽 4—5.5 厘米，先端渐尖，基部阔楔形，上面绿色，下面淡绿色；基出 3 脉。花绿色，6—8 朵组成总状花序；花序长约 11 厘米，数个簇生于叶腋。雄花：小苞片线形，长约 2 毫米；外轮萼片长圆形，长约 8 毫米，宽约 3 毫米，内轮 3 片狭长圆形或线形，长 5—7 毫米，宽约 1 毫米；花瓣鳞片状，卵圆形，长约 1 毫米；雄蕊花丝连合，花丝管与药室等长，长均为约 3 毫米，药隔突出所成之附属体长约 0.5 毫米；退化心皮 3，线形，长约 1.5 毫米。雌花与果未见。

花期 4 月。

产于西藏（墨脱）。生于海拔 850 米的林缘。

10. 线叶八月瓜 图版 4: 8—14

Holboellia linearifolia (T. Chen et H. N. Qin) T. Chen. — *H. angustifolia* Wall. subsp. *linearifolia* T. Chen et H. N. Qin in Cathaya 8—9: 112. 1997. — *H. bambusifolia* T. Chen in Icon. Corm. Sin. Suppl. 1: 485. 1982. nom. nud.

木质藤本。茎纤细而硬，直径约 2.5 毫米，绿色或灰黑色，具线纹。掌状复叶通常有小叶 7 片，有时 5 片；叶柄长 1.2—4 厘米；小叶近革质，狭线形，长 2—8 厘米，宽 3—6 毫米，先端钝或圆，顶具中脉伸出而成之小凸尖，基部圆或阔楔形，边缘背卷，上面绿色，下面粉绿色，中脉在上面凹入，下面强凸起，侧脉与中脉几成 90 度角平展开出，至近边缘处彼此汇合，网脉与侧脉在上面凹入，在下面微凸起；小叶柄极短，长 1.5—4 (5) 毫米。总状花序简化仅存 1—2 朵花，生于叶腋，基部为芽鳞片所包托；总花梗极短，长约 2 毫米；花梗纤细，长 18—25 毫米。雌花：淡绿色，萼片肉质，外轮 3 片倒卵形或长圆形，顶端 2 裂，长 8—9 毫米，宽 3—5 毫米，内轮 3 片较小，长约 7 毫米，宽 3—4 毫米；花瓣极小，长不及 1 毫米；退化雄蕊长约 1 毫米，无花丝，顶具微小凸头；心皮 3，棒状，长约 4 毫米，柱头顶生，两唇形。雄花未见。果孪生或单生，椭圆形，长约 2.5 厘米，宽约 1.4 厘米，基部收狭为短柄状，外面密布小疣凸，果梗长约 3 厘米，果序梗长约 1 厘米。花期 6 月，果期 6—8 月。

产于四川（米易）。生于海拔 1700—1800 米的山坡林中或林缘。