

3片披针形，长约18毫米，宽4—5毫米，内轮3片线形，长约14毫米，宽1.8—2毫米；花丝长约3毫米，合生为管；花药离生，长约3毫米，顶端具与其等长的角状附属体；退化心皮小，锥尖。雌花未见。果椭圆状，长3—4厘米，直径2—3厘米，先端有略弯的凸头，熟时黄色，果皮干后黑色，密布小疣点。花期4—5月，果期7月。

产于广东（大埔、蕉岭、从化）。生于海拔350—500米的山谷水旁疏林中。模式标本采自广东大埔。

8. 紫花野木瓜

Stauntonia purpurea Y. C. Liu et F. Y. Lu in Quart. Journ. Chinese For. 11: 110. 1978; H. N. Qin in Cathaya 8—9: 148, Fig. 65. 1997.

木质藤本。幼茎和枝有细纵纹，老茎表皮木栓化，粗糙，不规则分裂。掌状复叶有小叶3—5片；叶柄长3—6（8）厘米；小叶革质，长圆形或倒卵状长圆形，长5—9（11）厘米，宽2.5—5厘米，先端渐尖或钝圆而具小尖头，基部钝圆，干时边缘皱波状，上面绿色，下面灰绿色，有白褐色斑点；中脉在上面凹入，侧脉在上面平坦，不显著，在下面明显。花黄白色，下部有紫斑或全花紫色，雌雄同株，3—7朵组成稀疏的伞房式总状花序；花梗长2—5厘米。雄花：外轮萼片卵状披针形，长10—15毫米，宽3—5毫米，内轮的线状披针形，长9—12毫米，宽2—3毫米；花瓣缺；雄蕊6，花丝全部合生为筒，长约3毫米，花药长约4毫米，角状附属体长2—3毫米。雌花：萼片与雄花的同形但略大，约较之长2—3毫米；花瓣缺；退化雄蕊长约1毫米；心皮3，卵状柱形。果椭圆形，长3—7厘米，直径2—3厘米，熟时黄色，干后结肠状。花期4—5月，果期9—10月。

产于我国台湾。生于海拔1000—1600米的山谷密林下及路边灌丛中。

9. 三脉野木瓜 炮仗花藤（广东增城）

Stauntonia trinervia Merr. in Lingnan Sci. Journ. 13: 24. 1934; Y. C. Wu in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 13: 371. 1936; H. N. Qin in Cathaya 8—9: 144. 1997, pro parte, excl. syn. *S. glauca* Merr. & Metc. et syn. *S. crassipes* T. Chen

木质藤本，全株无毛。枝圆柱形，干时褐紫色，略有线纹。掌状复叶有小叶3—5片；叶柄长3—6厘米；小叶革质，长圆形、倒卵状长圆形或椭圆形，长7—10厘米，宽3—5厘米，先端急尖而具凸头或圆而具小凸尖，基部圆或微呈心形，边缘加厚，背卷，上面深绿色，有光泽，下面粉绿色，干时两面均呈褐色而杂以黄绿色的斑块；基脉3条，侧脉每边7条，与疏离的网脉同于两面略凸起；小叶柄长1.5—4厘米。总状花序腋生，长4—6厘米，小花；总花梗长1—2.5厘米；花雌雄异株，雄花暗黄色，长约16毫米；花梗纤细，长约1厘米；萼片厚，稍肉质，外轮的披针形至卵状披针形，长约16毫米，宽4—5毫米，顶端钝，内面略被微毛，有脉8条，内轮的线状披针形，宽约2毫米，内面无毛，有脉3条；花瓣缺；雄蕊花丝合生为长约4毫米的管，花药分