

另一对白色，长约 2.5 毫米，内萼片 4，披针形，长约 2 毫米；花瓣 4 枚，无距，近圆形，长约 1 毫米，先端稍内卷，基部阔楔形；雄蕊长约 2.2 毫米，花丝扁平，长约 0.7 毫米，花药长约 1.5 毫米，瓣裂，先端圆钝；雌蕊长约 2 毫米，花柱长约 1 毫米。蒴果长约 1.5 厘米，宿存花柱喙状，长约 5 毫米。花期 4—5 月，果期 5—6 月。

产于湖南。生于林缘。海拔 600—1000 米。模式标本采自湖南保靖。

本种小叶基部平截，不呈心形；花瓣圆形，无距，不同于中国淫羊藿属其他种类。

8. 三枝九叶草

Epimedium sagittatum (Sieb. & Zucc.) Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg. **23** : 310, 1877; Hance in Journ. Bot. **20** : 2, 1882; Franch. in Bull. Soc. Bot. France **33** : 110, 1886; Ito in Journ. Linn. Soc. Bot. **22** : 432, 1887; Komarov in Acta Hort. Petrop. **29** : 134, 1908; Baker in Gard. Chron. N. S. **13** : 683, 1880; Makino in Inumai **2** : 123, t. 44, 1907; Hand.-Mazz. Symb. Sin **7** : 325, 1931; Terasaki, Nippon Shokub. Zufu, 153, 1933; Stearn in Journ. Linn. Soc. Bot. **51** : 505, 1938, et in Kew Bull. **45** (4): 688, 1990, in clavi; 中国高等植物图鉴 **1** : 764, 图 1527, 1972; 秦岭植物志 **1** (2): 327, 图 280, 1974; Ying in Acta Phytotax. Sin. **13** (2): 53, 1975; 湖北植物志 **1** : 405, 图 571, 1976; 河南植物志 **1** : 499, 图 640, 1981; 福建植物志 **2** : 48, 1985; 安徽植物志 **2** : 345, 图 654, 1986; 浙江植物志 **2** : 317, 图 2—420, 1992. —*Aceranthus sargitatus* Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Munch. **4** (2): 175, pl. 2.1845. —*A. triphyllus* C. Koch in Miq. Ann. Mus. Lugd.-Batav. **1** : 253, 1864. —*A. macrophyllus* Blume ex C. Koch, loc. cit., 1864. —*Epimedium sinense* Sieb. in Miq. Ann. Mus. Lugd.-Batav. **2** : 71, 1865. —*E. coactum* var. *longtouhum* H. R. Ling in Acta Phytotax. Sin **28** (4): 322, 1990. syn. nov.

8a. 三枝九叶草 (原变种)

var. *sagittatum*

多年生草本，植株高 30—50 厘米。根状茎粗短，节结状，质硬，多须根。一回三出复叶基生和茎生，小叶 3 枚；小叶革质，卵形至卵状披针形，长 5—19 厘米，宽 3—8 厘米，但叶片大小变化大，先端急尖或渐尖，基部心形，顶生小叶基部两侧裂片近相等，圆形，侧生小叶基部高度偏斜，外裂片远较内裂片大，三角形，急尖，内裂片圆形，上面无毛，背面疏被粗短伏毛或无毛，叶缘具刺齿；花茎具 2 枚对生叶。圆锥花序长 10—20 (—30) 厘米，宽 2—4 厘米，具 20—60 朵花，通常无毛，偶被少数腺毛；花梗长约 1 厘米，无毛；花较小，直径约 8 毫米，白色；萼片 2 轮，外萼片 4 枚，先端钝圆，具紫色斑点，其中 1 对狭卵形，长约 3.5 毫米，宽 1.5 毫米，另 1 对长圆状卵形，长约 4.5 毫米，宽约 2 毫米，内萼片卵状三角形，先端急尖，长约 4 毫米，宽约 2