

米,奇数一回羽状,羽片 2—4 对,互生,斜向上,相距 1—2 厘米;羽片阔倒卵形或阔卵状三角形,长宽各约 1 厘米,圆头,中央具 1 (罕 2) 浅阔缺刻,全缘,基部圆楔形或近圆形,两侧呈微波状,有短柄,长可达 3 毫米(约等于羽片长度的 1/5 或更短),柄端具关节,干后羽片易从关节脱落而柄宿存,顶生羽片与侧生同形而稍大。叶脉二歧分叉,直达软骨质的边缘,两面均可见。叶干后厚纸质,上面淡灰绿色,下面灰白色,两面均无毛;羽轴、小羽柄和叶柄同色,有光泽。孢子囊群每羽片 1 枚(罕 2 枚);囊群盖肾形或新月形(罕近圆形),上缘呈弯凹,棕色,革质,宿存。

产广东(灵山)、广西(桂林、阳朔)、湖南(黔阳)、湖北(宣恩)、贵州(遵义、惠水、通州)、云南(麻栗坡)。群生于湿润的岩壁、石缝或山洞中的白垩土上,海拔 620—1 500 米。也产越南北部。模式标本采自贵州。

本种近似于粤铁线蕨 *A. lianxianense* Ching et Y. X. Lin, 其区别点主要在于形体较高大、粗壮和坚挺,羽片也较大,为阔倒卵形或阔倒卵状三角形,下面灰白色,羽柄较短,长度仅等于羽片长的 1/5。

5. 仙霞铁线蕨(植物分类学报) 图版 46: 10—11

Adiantum juxtapositum Ching in Acta Phytotax. Sinica 6:312. 1957 et Ic. Fil. Sin. 5:t. 212. 1958; Pic. Ser., Ind. Fil. Suppl. 4:6. 1965; Y. L. Chang et al., Sporae Pterid. Sin. 173. t. 36, 13—14. 1976; Fl. Fujian. 1:87. f. 79. 1982.

植株高 8—20 厘米。根状茎短而直立,先端被黑棕色的披针形鳞片。叶簇生;柄长 2—9 厘米,粗约 1 厘米,栗色,有光泽,光滑;叶片披针形,长 4—11 厘米,宽 1.5—3 厘米,奇数一回羽状,羽片 5—9 对,对生,向顶端近互生,平展,下部的相距 2 厘米,上部的相距 1 厘米;小羽片近圆形、阔倒卵形(罕倒三角形),长约 1 厘米,宽 1.2—1.5 厘米,上缘圆形,略呈波状,基部圆楔形(罕楔形),具短柄(长 2—3 毫米),柄端具关节,干后羽片易从关节脱落而柄宿存,上部略小,倒三角形或扇形。叶脉多回二歧分叉,直达软骨质的边缘,两面均明显。叶干后近革质,上面淡草绿色,下面淡灰白色,无毛;羽轴、小羽柄均与叶柄同色,有光泽,光滑。孢子囊群每羽片通常 3—4 (罕 1, 2 或 6) 枚;囊群盖圆形或圆肾形(罕长形),上缘平直或稍凹陷,黑色,革质,全缘或呈微波状,宿存。孢子周壁具模糊的颗粒状纹饰,颗粒大小不一致,处理后常保存。

特产福建北部(仙霞岭)。生石灰岩的石缝中。

6. 北江铁线蕨(植物分类学报) 图版 46: 12

Adiantum chienii Ching in Sinensia 1:50. 1930; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. 3:18. 1934; Ching, Ic. Fil. Sin. 4:t. 159. 1937 et Acta Phytotax. Sinica 6:312. 1957.

植株通常高 20—30 厘米。根状茎短而直立,先端被栗棕色的线形鳞片。叶簇生;柄长 5—10 厘米,粗约 1 毫米,栗黑色,有光泽,光滑;叶片线状披针形,长 13—18 厘米,宽 3—4 厘米,奇数一回羽状;羽片 4—9 对,对生或近对生,平展,相距约 2 厘米;小羽片长宽各约

