

37: 368. 1982. —— *Triclisieae* Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**;
47. 1910; Troupin, Monogr. Menisperm. Afric. 21. 1962; Forman
in Kew Bull. **30**: 77. 1975.

萼片通常多数, 螺旋状着生或排成三数的轮, 分离或最里面的 3 片合生成假花冠状; 花瓣 6 或部分退化, 或无; 雄蕊多数至 3 枚, 通常 6 枚, 分离或不同程度的合生; 心皮多数至 3 个, 分离, 通常生于一延长的轴上。核果一边肿胀, 花柱残迹低于核果之顶部至靠近基部; 果核微有皱纹, 骨质或脆壳质, 通常被纤维状毛; 种子通常无胚乳; 胚大, 马蹄形或弯成环状, 子叶缘倚, 常不等大, 半柱状, 很少扁平, 胚根极短。叶非盾状。

本族模式属: *Tiliacora* Colebr.

14 属, 广布于全世界的热带和亚热带地区。我国有 3 属, 产南部至西南部。

1. 密花藤属 *Pycnarrhena* Miers ex Hook. f. et Thoms.

Miers (in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, **7**: 44. 1851, nom. nud.)
ex Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. **1**: 206. 1855; Diels in Engler, Pflanzen-
reich IV. **94**: 48. 1910; Forman in Kew Bull. **26**: 405. 1972. ———
Antitaxis Miers in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, **20**: 12. 1867. ———
Pridania Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France **85**: 170. 1938. ——— *Bata-*
nia Hatusima in Mem. Fac. Agr. Kagoshima Univ. **5**: 29. 1966.

藤本; 老枝常具杯状叶痕。叶柄通常较短, 叶片具羽状脉, 有时兼具掌状基出脉。聚伞花序腋生或有时生于老枝上, 通常退化仅存 1 花, 数个簇生, 较少单生; 雄花: 萼片 6—15 片, 轮生, 通常每轮 3 片, 覆瓦状排列, 最内轮的明显较大, 通常圆而深凹, 外轮小, 最外轮的常呈小苞片状; 花瓣 2—5 片, 很小, 通常阔倒卵形, 有时无花瓣; 雄蕊数目不定, 约 2—18 个, 花丝大部合生, 花药近球形, 横裂; 雌花: 萼片和花瓣与雄花相似; 心皮 2—6 个, 卵形, 背侧稍隆起, 柱头舌状, 外折。核果近球形无伸长之心皮柄, 花柱残迹位于腹侧; 果核纸质、软骨质或近木质, 胎座迹常不明显; 种子与果核近同形, 无胚乳; 子叶大, 肉质, 稍弯, 比胚根长很多。

本属模式种: *P. planiflora* (All.) Miers

约 9 种, 分布于亚洲东南部和澳大利亚的昆士兰。我国有 2 种, 见于云南和海南。

分种检索表

- 1. 聚药雄蕊有 4—5 个花药; 内轮萼片近圆形, 囊状 1. 密花藤 *P. lucida* (Teijsm. et Binn.) Miq.
- 1. 聚药雄蕊有 8—11 个花药; 内轮萼片椭圆形, 不呈囊状 2. 硬骨藤 *P. poilanei* (Gagnep.) Forman