

定论。

2. 雅丽千金藤 (植物分类学报)

Stephania elegans Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. **1**: 195. 1855; Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**: 273. 1910; Lo in Acta Phytotax. Sin. **16**: 22, fig. 2 (4—6). 1978; 云南植物志 **3**: 243, 图版 68 (10—12). 1983. ——*Clypea* sp. Griff. Not. Pl. Asiat. **4**: 304. 1854, Ic. Pl. 492.

草质藤本; 枝纤细, 有条纹, 无毛或近无毛。叶纸质, 长三角形或卵状三角形 (有时近三角形), 长 5—10 厘米, 宽 2.5—5.5 厘米, 顶端渐尖至短尖, 有时钝, 基部近截平至微凹 (有时心形), 干时通常褐色, 两面无毛, 上面光亮; 掌状脉向上和向下的各约 4—5 条, 在下面凸起, 网脉稍明显; 叶柄长 2—4 厘米, 明显盾状着生。单伞形聚伞花序 (或复伞形聚伞花序), 总花梗细而直; 花未见, 据记载花有梗, 浅绿色或紫色, 雄花: 萼片 6, 无毛, 暗紫色, 倒卵形, 长约 1.6 毫米, 宽约 1 毫米; 花瓣 3, 稍肉质, 阔倒卵形, 顶端常微凹, 长 0.8 毫米; 聚药雄蕊长 1 毫米; 雌花花被和雄花相似。核果红色, 阔倒卵状球形, 长约 7 毫米, 基部近截平; 果核长 5—6 毫米, 背部每边具小横肋状雕纹约 10 条, 胎座迹不穿孔。 果期 11 月。

产于云南镇源、腾冲等地。尼泊尔、锡金和印度东北也有分布。

3. 纤细千金藤 (西藏植物志)

Stephania gracilentia Miers, Contr. Bot. **3**: 219. 1871; Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**: 273. 1910; Lo in Bull. Bot. Res. **2** (1): 39. 1982; 西藏植物志 **2**: 160, 图 46 (4—5). 1985.

草质藤本, 全株无毛; 枝纤细, 有直线纹, 干时褐色。叶薄纸质或近膜质, 三角状近圆形, 长 3—7 厘米, 宽度与长度近相等或稍过之, 顶端常有小凸尖, 基部近截平, 两面苍白, 下面尤盛; 掌状脉 8—9 条, 向上的 3 或 5 条较粗大, 近中部二叉状分枝, 网状小脉稍明显; 叶柄长 3—10 厘米, 明显盾状着生。单伞形聚伞花序腋生或生于腋生、具小型叶短枝上, 总梗极纤细, 长 1—4 厘米, 其上着生 5—6 个小聚伞花序; 花紫色, 花梗丝状, 长 0.5—1 毫米; 雄花: 萼片 6, 倒卵状长圆形至阔椭圆形, 长 1.5—2 毫米; 花瓣 3 或 4, 稍肉质, 阔楔形至倒心形或近圆形, 长 0.8—1 毫米; 聚药雄蕊长 1 毫米; 雌花花被和雄花相似。核果未见, 据记载为倒卵形, 稍扁, 果核背面有 7—8 条小横肋状雕纹。 花期 6 月。

产于西藏聂拉木和樟木。生于海拔 1 700—2 400 米的山坡林下。

4. 西南千金藤 (植物分类学报) 图版 9: 10—12

Stephania subpeltata Lo in Acta Phytotax. Sin. **16**: 22, fig. 1 (10—12). 1978; 云南植物志 **3**: 247, 图版 70 (7—9) 1983; 西藏植物志 **2**: 160. 1985.

草质缠绕藤本, 全株无毛。茎下部常生须状不定根, 少分枝; 枝绿色, 纤细, 有直线纹。叶薄革质, 卵状三角形、阔卵状三角形至近三角形, 长 3.5—10 厘米, 宽 2.5—5.5