

1.2 毫米，宽约 0.5—0.8 毫米，很少达 1 毫米，质地薄；花瓣 3—4，稍肉质，近倒三角形或阔楔形，长约 0.5 毫米；聚药雄蕊长 0.7 毫米；雌花：萼片和花瓣均 3 片，很少 4 片，形状和大小均与雄花的相似；心皮无毛，柱头常 3 裂，裂片长而尖。核果红色，无毛；果核倒卵形，长约 4—5 毫米，背部有 2 行小横肋状雕纹，每行约 5—8 条，很少达 10 条，胎座迹不穿孔。

产于云南各地（北部和东南部除外），四川南部和贵州南部也有。生于灌丛、园篱、路边等处。模式标本采自云南鹤庆。

组 2. 千金藤组 Sect. *Stephania*

小聚伞花序无梗或近无梗，密集，排成复伞形聚伞花序。

9. 千金藤（通称） 图版 10：1—3

Stephania japonica (Thunb.) Miers in Ann. Nat. Hist. ser. 3, **18**: 14. 1866 et Contr. Bot. **3**: 213. 1871; Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**: 277. 1910; 中国高等植物图鉴 **1**: 783, 图 1566. 1972; Lo in Acta Phytotax. Sin. **16**: 28, fig. 4 (1—3) 1978. — *Menispermum japonicum* Thunb. Fl. Jap. 195. 1784.


稍木质藤本，全株无毛；根条状，褐黄色；小枝纤细，有直线纹。叶纸质或坚纸质，通常三角状近圆形或三角状阔卵形，长 6—15 厘米，通常不超过 10 厘米，长度与宽度近相等或略小，顶端有小凸尖，基部通常微圆，下面粉白；掌状脉约 10—11 条，下面凸起；叶柄长 3—12 厘米，明显盾状着生。复伞形聚伞花序腋生，通常有伞梗 4—8 条，小聚伞花序近无柄，密集呈头状；花近无梗，雄花：萼片 6 或 8，膜质，倒卵状椭圆形至匙形，长 1.2—1.5 毫米，无毛；花瓣 3 或 4，黄色，稍肉质，阔倒卵形，长 0.8—1 毫米；聚药雄蕊长 0.5—1 毫米，伸出或不伸出；雌花：萼片和花瓣各 3—4 片，形状和大小与雄花的近似或较小；心皮卵状。核果倒卵形至近圆形，长约 8 毫米，成熟时红色；果核背部有 2 行小横肋状雕纹，每行约 8—10 条，小横肋常断裂，胎座迹不穿孔或偶有一小孔。

我国见于河南南部（鸡公山）、四川（重庆北碚）、湖北、湖南、江苏、浙江、安徽、江西、福建。生于村边或旷野灌丛中。日本、朝鲜、菲律宾、汤加群岛和社会群岛、印度尼西亚、印度和斯里兰卡均有分布。

根含多种生物碱，为民间常用草药，味苦性寒，有祛风活络、利尿消肿等功效。

10. 桐叶千金藤（植物分类学报） 图版 10：4—6

Stephania hernandifolia (Willd.) Walp. Repert. **1**: 96. 1842; Miers Contr. Bot. **3**: 222. 1871; Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**: 279. 1910; Lo in Acta Phytotax. Sin. **16**: 28, fig. 4 (4—6). 1978; 云南植物志 **3**: 245, 图版 68 (1—2). 1983; 西藏植物志 **2**: 162. 1985. — *Cissampelos hernandifolia* Willd. Sp. Pl. **4**: 861. 1805. — *Stephania japonica* (Thunb.) Miers var. *discolor* (Bl.) Forman in Kew Bull. **11**: 49. 1956.



图版 10 1—3. 千金藤 *Stephania japonica* (Thunb.) Miers: 1. 叶片; 2—3. 果核。4—6. 桐叶千金藤 *Stephania hernandifolia* (Willd.) Walp.: 4. 叶片; 5—6. 果核。7—9. 粪箕苳 *Stephania longa* Lour.: 7. 叶片; 8—9. 果核。(余汉平绘)