

花梗短，长 0.5—1.5 厘米，苞片 2—3 枚，长 1.8—2.2 毫米。雄花：紫色，萼片 3，圆形，直径不及 0.5 毫米；花瓣 3，匙形，与萼片互生，具极短柄。雌花未见。花期夏初。

产于西藏聂拉木和吉隆。生于海拔 2 000—2 340 米林下阴湿山坡上。模式标本采自吉隆。

16. 汝兰 (四川) 图版 14: 7—9

Stephania sinica Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**: 272. 1910; Lo in Acta Phytotax. Sin. **16**: 33, fig. 6 (7—9). 1978; 云南植物志 **3**: 248, 图版 69 (1—3), “sphalm. 图版 70 (1—3)”. 1983.


稍肉质落叶藤本，全株无毛；枝肥壮，常中空，有稍粗的直纹。叶干时膜质或近纸质，三角形至三角状近圆形，长 10—15 厘米或过之，宽度常大于长度，顶端钝，有小凸尖，基部近截平至微圆，很少微凹，边缘浅波状至全缘；掌状脉向上的 5 条，向下的 4—5 条，稍阔而扁，在下面微凸，网脉在下面明显；叶柄长达 30 厘米，顶端常肥大，干时扭曲，明显盾状着生。复伞形聚伞花序腋生，总梗和伞梗均肉质，无苞片和小苞片；雄花：萼片 6，稍肉质，干时透明，近倒卵状长圆形，长 1—1.3 毫米，内轮稍阔；花瓣 3，有时 4，短而阔的倒卵形，里面有 2 个大腺体，长约 0.8 毫米；聚药雄蕊长 0.7—0.8 毫米。雌花序亦为复伞形聚伞花序，但伞梗较粗短；雌花：萼片 1，花瓣 2，里面的腺体有时不很明显。果序梗长 5 厘米或更长，伞梗长 1—1.5 厘米；果梗肉质，干时黑色。核果的果核长 6—7 毫米，背部二侧各有小横肋状雕纹 15—18 条，小横肋中段低凹至断裂，胎座迹不穿孔。花期 6 月，果期 8—9 月。

产于湖北西部和西南部，四川东部、中部和南部，贵州北部和云南东北部（大关）。生于林中沟谷边。模式标本采自湖北房县。

17. 河谷地不容 (云南植物志)

Stephania intermedia Lo in Fl. Yunnan. **3**: 247. 1983.

草质或基部稍木质的落叶藤本，全株无毛；枝和小枝均圆柱状，有直纹，干后灰褐色。叶纸质，通常为不明显的三角状近圆形，长 8—15 厘米，宽与长近相等，顶端钝或微圆，常有小凸尖，基部近截平或微凹，两面暗晦；掌状脉 9—12 条，较粗大，连同网状小脉均在下面凸起，干后变褐色，稍有光泽；叶柄比叶片长，很少与之近等长，稍粗壮，顶端在距叶片基部约 2—3 厘米处盾状着生。复伞形聚伞花序通常腋生，雄花序具 3—5 厘米长的总梗，顶端通常有 5—6 条长约 2 厘米的伞梗，小聚伞花序有梗，4—6 个簇生于伞梗的末端；苞片和小苞片均线形或线状钻形；雄花：萼片 6，排成 2 轮，外轮椭圆状倒卵形，长 2—2.3 毫米，顶端钝或短尖，内轮稍小，基部骤然狭窄，顶端圆；花瓣 3，橙黄色，很阔，长 0.8—1 毫米。宽 1.5—1.8 毫米，两侧边缘内卷，呈镊合状排列；聚药雄蕊长 0.6—0.7 毫米，雌花序和雌花未见。果序复伞形状，总梗粗壮，长 5—7 厘米，伞梗 7—9 条，长 1—2 厘米，披散状伸展；果梗非肉质，核果倒卵圆形，长约 6 毫米；果核背部二侧各有小横肋状雕纹 18—19 条，小横肋中部几断裂，靠近中肋的一端微凸起，



图版 14 1—3. 广西地不容 *Stephania kwangsiensis* Lo: 1. 叶片; 2—3. 果核。4—6. 江南地不容 *Stephania excentrica* Lo: 4. 叶片; 5—6. 果核。7—9. 汝兰 *Stephania sinica* Diels: 7. 叶片; 8—9. 果核。

(余汉平绘)