

产于云南西南部。模式标本采自耿马。

20. **金线吊乌龟** (植物名实图考) 金线吊蛤蟆 (浙江), 独脚乌柏 (广东), 铁秤砣 (江西), 白药 (江西和广西), 玉咲葛藤 (台湾) 图版 11: 4—6

Stephania cepharantha Hayata, Ic. Pl. Formos. **3**: 12, fig. 8. 1913; Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos. **4**: 10, fig. 5—7. 1928 et in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **34**: 25. 1944 et in Taiwania **1**: 55. 1945; 中国高等植物图鉴 **1**: 784, 图 1567. 1972; Lo in Acta Phytotax. Sin. **16**: 39, fig. 7 (4—6). 1978; 广东植物志 **1**: 40 1987. —*S. tetrandra* S. Moore var. *glabra* Maxim. in Mem. Biol. **11**: 647. 1883. —*S. disciflora* Hand. —Mazz. Symb. Sin. **7**: 261. 1931.

草质、落叶、无毛藤本, 高通常 1—2 米或过之; 块根团块状或近圆锥状, 有时不规则, 褐色, 生有许多突起的皮孔; 小枝紫红色, 纤细。叶纸质, 三角状扁圆形至近圆形, 长通常 2—6 厘米, 宽 2.5—6.5 厘米, 顶端具小凸尖, 基部圆或近截平, 边全缘或多少浅波状; 掌状脉 7—9 条, 向下的很纤细; 叶柄长 1.5—7 厘米, 纤细。雌雄花序同形, 均为头状花序, 具盘状花托, 雄花序总梗丝状, 常于腋生、具小型叶的小枝上作总状花序式排列, 雌花序总梗粗壮, 单个腋生, 雄花: 萼片 6, 较少 8 (或偶有 4), 匙形或近楔形, 长 1—1.5 毫米; 花瓣 3 或 4 (很少 6), 近圆形或阔倒卵形, 长约 0.5 毫米; 聚药雄蕊很短; 雌花: 萼片 1, 偶有 2—3 (—5), 长约 0.8 毫米或过之; 花瓣 2 (—4), 肉质, 比萼片小。核果阔倒卵圆形, 长约 6.5 毫米, 成熟时红色; 果核背部二侧各有约 10—12 条小横肋状雕纹, 胎座迹通常不穿孔。花期 4—5 月, 果期 6—7 月。

分布地区西北至陕西汉中地区, 东至浙江、江苏和台湾, 西南至四川东部和东南部, 贵州东部和南部, 南至广西和广东。适应性较大, 既见于村边、旷野、林缘等处土层深厚肥沃的地方 (块根常入土很深), 又见于石灰岩地区的石缝或石砾中 (块根浮露地面)。模式标本采自台湾。

块根为民间常用草药, 味苦性寒, 功能清热解毒、消肿止痛, 又为兽医用药, 称白药、白药子或白大药。

块根含多种生物碱, 其中千金藤素 (cepharanthine) 有抗癆、治胃溃疡和矽肺等功效。全果含胡萝卜素; 种子含油达 19%。


组 2. 山乌龟组 Sect. *Tuberiphanis* Lo et M. Yang in Bull. Bot. Res. **2** (1): 41. 1982.

内果皮上具柱型雕纹; 雌、雄花序异形或近异形。

组的模式种和亚属同。

21. **黄叶地不容** (植物研究)

Stephania viridiflavis Lo et M. Yang in Bull. Bot. Res. **2** (1): 42, fig. 1 (1—7). 1982; 云南植物志 **3**: 248. 1983.



图版 11 1—3. 地不容 *Stephania epigaea* Lo.; 1. 叶片; 2—3. 果核。4—6. 金线吊乌龟 *Stephania cepharantha* Hayata; 4. 叶片; 5—6. 果核。7—9. 粉防己 *Stephania tetrandre* S. Moore; 7. 叶片; 8—9. 果核。(余汉平绘)