

草质、落叶藤本，长约3米或更长；茎、枝均有直线纹，干时呈紫褐色。叶柔软，纸质，三角状近圆形，长、宽均约8—15厘米，顶端短尖，有时钝头而具小凸尖，基部近截平或圆，全缘至有少数粗齿，两面无毛，干时上面常变黑色或灰褐色；掌状脉10—11条，连同网脉两面均可见，但下面较明显；叶柄与叶片近等长或有时比叶片长很多。复伞形聚伞花序通常腋生或有时生腋生短枝上，雄花序总梗长2.5—5厘米，伞梗5—10条，长约1厘米，很少达2厘米；苞片线状披针形；雄花：萼片6，淡绿色，外轮3片倒披针形至倒卵形，长约1.5毫米，内轮近菱形，中部以下骤狭成爪，长约1.5—1.7毫米，宽1.2—1.5毫米；花瓣3，绿黄色，阔楔形，长0.7毫米，宽0.8—1毫米，里面有2个腺体；聚药雄蕊长约0.7毫米，花药通常6个；雄花序总梗长3—7厘米，伞梗多至10余条，长3—4毫米，肉质，干时黑色；雌花：萼片1，微小，花瓣2，阔卵状圆形，长约0.6毫米，心皮无毛。核果具肉质果梗，成熟时红色；果核阔倒卵圆形，长约6毫米，背部有4列短柱状凸起，每列15—17颗，每颗的顶端扩大呈头状，胎座迹穿孔。花期6—7月，果期9—10月。

产云南东部和西部（临沧、凤庆）。常生于林下多石砾的地方。模式标本采自开远。

本种块根含较多量的左旋荷包牡丹碱（1-dicendrine）和较少量的颠通定（rotundine）。我国产的本属植物发现左旋荷包牡丹碱就是从本种的块根中首次分离得到的。

27. 大花地不容（广西植物） 老人头（云南漾濞）

Stephania macrantha Lo et M. Yang in *Guihaia* 8: 309. 1988.

草质藤本，有硕大的块根，除花外全株无毛；枝干时近褐色，有纵沟槽。叶片近纸质，阔卵状近圆形，长8—13厘米，宽8—11厘米，顶端短尖或近渐尖，有时有细尖，基部心形或近截平，边缘有角或有角状粗齿；掌状脉9—11条，干时紫褐色，两面均明显；叶柄长5—11厘米，雄性复伞形聚伞花序腋生，总梗长2—4厘米，伞梗4—5，长0.6—2厘米，通常无苞片和小苞片，很少在花梗上有一线形小苞片；花梗长2—5毫米；萼片6，近楔形，有长爪，长约3毫米（其中爪长约2毫米），上部宽约1.5毫米，背部有透明的乳头状毛，花瓣3，阔楔形，长、宽均约1.4毫米，里面上部有小瘤状突起；聚药雄蕊有纤细、长约0.7毫米的柄。雌花和核果均未见。花期5月。

产云南漾濞一带；生于海拔1400米处石山灌丛中。

在我国产的千金藤属植物中，本种的花朵是最大的，它的萼片背面密生透明的乳头状毛也很特殊，所以是个很好识别的种。

28. 药用地不容（广西植物）

Stephania officinarum Lo et M. Yang in *Guihaia* 8: 310, 1988.

草质藤本，有硕大的块根，全株无毛；枝干后变紫黑色，有直沟纹。叶片薄纸质，近圆形，直径约10—12.5厘米，顶端圆或不明显短尖，基部圆；掌状脉8—10条，常二叉状分枝，小脉网在下面清晰可见；叶柄比叶片稍长或较短，明显盾状着生，着生处距叶片基部约3—4厘米，基部藤曲状，雄花序为复伞形聚伞花序，单生叶腋或多个生于腋生