

序，腋生或生于腋生、具小型叶的稍肉质短枝上，雄花序总梗长 3—8 厘米，伞梗 5—8 条，长 3—3.5 厘米；苞片线形或偶有叶状；雌花序紧缩呈头状，总梗较粗壮，伞梗花期极短，至结果时始稍伸长；雄花：萼片黄绿色，6 片，排成 2 轮，狭椭圆形或近披针形，长 1.9—2 毫米，宽约 0.6 毫米；花瓣橙黄，阔楔形；顶端截平或稍呈浅波状，基部增厚，长 0.6—0.7 毫米，覆瓦状排列；聚药雄蕊长约 1 毫米；雌花有 1 个微小呈鳞片状的萼片，2 个稍大、橙黄色的花瓣。核果阔倒卵圆形，红色；果核长 7.5—8 毫米，宽约 6 毫米，背部有 4 行柱状雕纹，每行约 19—20 颗，柱状凸起的顶端弯钩状，胎座迹穿孔。花期 5 月，果期 8 月。

产于广西马山、都安和宜山。生于石灰岩山地石缝中。模式标本采自马山。

本种雄花花瓣无腺体，内果皮背部的柱状凸起顶端呈弯钩状，与荷包地不容和桂南地不容都不同。

本种块根常大型，含多量左旋荷包牡丹碱（1-dicendrine）。

31. 小花地不容（植物研究）

Stephania micrantha Lo et M. Yang in Bull. Bot. Res. 2: 52. fig. 1 (8—13). 1982.

草质藤本；茎、枝细瘦而稍坚挺，有直线纹，全株无毛。叶片纸质，三角状扁圆形至近圆形，长通常 3.5—7.5 厘米，宽 4—8 厘米，顶端圆钝或急尖，基部近截平或微凹，边全缘、浅波状或 3—5 浅裂，下面网状小脉上密生小乳突；掌状脉 9—10 条，纤细；叶柄纤细，通常比叶片长至长很多。雄花序为复伞形聚伞花序，腋生或数个生于一曲折、稍肉质的短枝上，总花梗长通常 1—2 厘米，偶有达 4 厘米，稍纤细，伞梗常 4—7 条，长 0.3—1 厘米，苞片线形，小聚伞花序稍密集；雄花：萼片 6，排成 2 轮，外轮倒披针形，内轮倒卵形，长 1.3—1.5 毫米；花瓣橙黄色，3 片，贝壳状，长 0.6—1 毫米，顶端截平或近截平，基部稍增厚，无腺体；聚药雄蕊长 0.7 毫米，花药 6 个；雌花序仅见早期的，头状，总梗稍粗壮，长约 1 厘米，伞梗和小聚伞花序均极短。核果倒卵圆形，红色；果核长 6—7 毫米，宽 4—5 毫米，背部有 4 行短柱状的雕纹，每行 20—25 颗，柱状凸起顶端弯钩状，稍阔扁，胎座迹穿孔。花期 4—5 月，果期 7 月。

产于广西龙州。生于石山上。

本种近广西地不容，区别在于后者雄花瓣内有 2 个腺体，内果皮上的柱状雕纹较少，每行不超过 20 颗，叶片较大。

本种块根硕大，重达几十公斤，据初步分析颇通定的含量较黄叶地不容和广西地不容为少。在龙州上金石灰岩山上，本种是很常见的植物，是提取颇通定的主要原料之一。

32. 长柄地不容（植物研究）

Stephania longipes Lo in Bull. Bot. Res. 2 (1): 54. 1982; 云南植物志 3: 254. 1983.

草质，落叶藤本，全株无毛；枝、叶含红色液汁，小枝有直线纹，干时淡褐色。叶纸质，三角状近圆形，长 9—15 厘米，宽 8—14 厘米，顶端锐尖，有时稍钝而具小凸尖，基部近截平至微凹，边缘有角状或波状粗齿，较少全缘，干时常暗绿色；掌状脉 10—11