

我国产具有块根的千金藤属植物中,除金线吊乌龟外,本种是分布最广的一个种,形态上变异也较大。它的块根既可生于地下,呈条状或纺锤状,也可露于地面,呈团块状;它的雌花虽然多数是左右对称的,但也发现有辐射对称的。由于各地标本大多不完整,故其变异规律尚需继续观察研究。

38. 川南地不容 (广西植物)

Stephania ebracteata S. Y. Zhao et Lo in Guihaia 10: 181. 1990.

藤本,长2—3米或过之。全株无毛,块根硕大,外面灰棕色,密生小瘤状凸点;茎扭曲,具纵沟纹,干后黄绿色,松软,中空,叶纸质,三角状圆形,长10—18厘米,宽9—18厘米,顶端钝,具细尖,基部截平、圆形或微心形,边全缘或微波状,很少有角;掌状脉9—10条,向下的纤细;叶柄通常比叶片长很多,约15—25厘米,两端肿胀,明显盾状着生。雄花序腋生,总梗长约2—5厘米,无苞片或偶有一个叶状苞片,伞梗4—7,长1—3厘米,小聚伞花序有梗,很多,伞房状排列;萼片5—6,基部合生,淡黄绿色,外轮倒卵状椭圆形,长1.7—2毫米,宽1—1.2毫米,内轮阔卵形,长1.8—2毫米,宽1.5毫米,有爪,瓣片二侧有耳;花瓣3,肉质,常贝壳状,高1.4毫米,里面有2个大腺体;聚药雄蕊长0.8毫米。雌花未见。果序梗长2.5—6厘米;核果成熟时红色,近圆形,压扁,长约9毫米,具肉质的果梗;果核倒卵状近圆球形,长约7毫米,宽约6毫米,背部具4行柱状或短柱状凸起,每行12—16颗,柱状凸起的顶端阔而扁,稍呈弯钩状,胎座迹偏侧穿孔。花期8—9月。

产于四川米易县普威乡青菜沟等地。生于2500米处之沟边。

本种与江南地不容最近似,但花大;小聚伞花序伞房状排列。

39. 米易地不容 (植物研究)

Stephania miyiensis S. Y. Zhao et Lo in Guihaia 10: 183. 1990.

藤本;块根纺锤状或不规则棒状,黄褐色,有小瘤状皮孔;茎扭曲,有直线纹,实心,基部直径达1厘米。叶纸质,阔卵圆形至三角状近圆形,长、宽均约7—18厘米,顶端有小凸尖,基部截平、圆或微心形;掌状脉向上的3条和平伸的2条均较粗大,向下的5—7条纤细;叶柄长7—20厘米,于叶片距基部1.5—4厘米处盾状着生。雄花序为伞形聚伞花序,腋生或有时生于无叶老茎上,总花梗长1.5—6厘米,伞梗4—9条,苞片丝状,小聚伞花序和花均有梗;萼片6,排成2轮,外轮卵形或倒卵状披针形,长1.8—2.2毫米,宽0.9—1.1毫米,内轮阔卵圆形,长1.8—2.2毫米,宽1.3—1.8毫米,基部有爪,瓣片二侧耳状;花瓣3,楔形或阔楔形,肉质,长约1.2毫米,宽约1.8毫米,背面内凹,腹面有2个大腺体;聚药雄蕊长1.6毫米。雌花未见。核果具肉质果梗,成熟时红色;果核近圆球形,径5—6.5毫米,背部有4行钩刺状雕纹,每行10—14颗,胎座迹不穿孔。

产于四川米易菖蒲湾。